





Mölnlycke®

Mepilex® Border Flex

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY



STERILE EO



Single use
Usage unique



See instructions for use
Voyez le mode d'emploi



Keep dry
Conserver au sec

CE 2797

Manufacturer / Fabricant




Mölnlycke Health Care AB


Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

en	Medical Device
de	Medizinprodukt
fr	Dispositif médical
es	Producto sanitario
nl	Medisch hulpmiddel
sv	Medicinteknisk produkt
it	Dispositivo medico
fi	Lääkinnällinen laite
pt	Dispositivo médico
da	Medicinsk udstyr
el	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
pl	Wyrób medyczny
cs	Zdravotnický prostředek
hu	Orvostechnikai eszköz
no	Medisinsk utstyr
sl	Medicinski pripomoček
bg	Медицинско изделие

Mepilex® Border Flex < 14x15cm/6x6in



Mepilex® Border Flex ≥ 14x15cm/6x6in





en For low exuding wounds



de Für schwach exsudierende Wunden



fr Pour les plaies faiblement exsudatives



hu Enyhén váladékozó sebekhez



Erősen váladékozó sebekhez

de Für mäßig exsudierende Wunden

fr Pour les plaies modérément exsudatives

es Para heridas con poco exudado

nl Voor licht exsuderende wonden

sv För svagt vätskande sår

it Per lesioni scarsamente essudanti

fi Vähän erittäville haavoille

pt Para feridas com exsudado reduzido

da Til let væskende sår

el Για τραύματα ελαφρού εξιδρώματος

pl Rany z małym wysiękiem

cs Na slabě exsudující rány

For moderately exuding wounds

Für stark exsudierende Wunden

Pour les plaies hautement exsudatives

Para heridas con mucho exudado

Voor matig exsuderende wonden

För måttligt vätskande sår

Per ferite moderatamente essudanti

Kohtalaisesti erittäville haavoille

Para feridas com exsudado moderado

Til moderat væskende sår

Για τραύματα ήπιου εξιδρώματος

Rany z umiarkowanym wysiękiem

Na středně exsudující rány

For highly exuding wounds

Za rane z malo izcedka

За слабо ексудиращи рани

Voor sterk exsuderende wonden

För kraftigt vätskande sår

Per lesioni altamente essudanti

Runsaasti erittäville haavoille

Para feridas com exsudado intenso

Til kraftigt væskende sår

Για τραύματα έντονου εξιδρώματος

Rany z dużym wysiękiem

Na vysoce exsudující rány

Brukes på lett væskende sår

За умерено ексудиращи рани

Pentru răni care exsudează ușor

Pre miernie mokvajúce rany

Hafif eksudasyonlu yaralar için

Mažai eksuduojančioms žaizdoms

Brūcēm ar zemu eksudācijas pakāpi

Vähese eritusega haavadele

Для ран с низкой экссудацией

Za slabo vlažeće rane

Za rane sa blagom eksudacijom

Közepe sen váladékozó sebekhez

Brukés på moderat væskende sår

Za rane z zmerno koliciño izcedka

Za umereno eksudirashi rani

Pentru răni care exsudează moderat

Pre stredne mokvajúce rany

Orta eksudasyonlu yaralar için

Vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms

Brūcēm ar mērenu eksudācijas pakāpi

Keskmine eritusega haavadele

Для ран с умеренной экссудацией

Za umjerenou vlažeće rane

За изнено влаžeће ране

Za rane sa umerenom eksudacijom

تازارف إلأ مطسوتم حور جلل

За силно ексудиращи рани

Pentru răni care exsudează abundent

Pre silne mokvajúce rany

Cök eksudasyonlu yaralar için

Stipriaı eksuduojančioms žaizdoms

Brūcēm ar augstu eksudācijas pakāpi

Rohke eritisega haavadele

Для ран с обильной экссудацией

Za iznimno vlažeće rane

Za rane sa izraženom eksudacijom

تازارف إلأ قریش حور جلل

- en** Wound pad size
de GröÙe Wundaflage
fr Taille de la matrice
es Medida del apósito para cubrir la herida
nl Formaat wondkussen
sv Sårdynans storlek
it Dimensione tampone
fi Haavatyynyn koko
pt Tamanho do penso para feridas
da Sårpudens størrelse
el Μέγεθος επιθέματος πληγής
pl Wielkość wkładki stykającej się z raną
cs Velikost krytí
hu Sebfedő párna mérete
no Sårputens størrelse
sl Velikost oblage za rane
bg Размер на подложката за рани
ro Dimensiune tampon plagă
sk Veľkosť tampónu obväzu
tr Yara örtüsü boyutu
lt Žaizdos pagalvėlės dydis
lv Brūces spilventiņa izmērs
et Haavapadja suurus
ru Размер раневой прокладки
hr Veličina povojā za rane
sr Veličina jastučića za ranu



- en** Do not use if package is damaged
de Bei beschädigter Verp. verwerfen
fr Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
es No utilizar si el envase está dañado
nl Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is
sv Skall inte användas om förpackningen är skadad
it Non utilizzare se la confezione è danneggiata
fi Älä käytä jos pakkaus vaurioitunut
pt Não usar se embalagem danificada
da Brug ikke, hvis pakken er beskadiget
el Μνω το χρησιμοποιήσετε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
pl Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone
cs Nepoužívejte, je-li obal poškozen
hu Ne használja, ha a csomagolás sérült
no Må ikke brukes hvis forpakningen er skadet
sl Ne uporabite, če je ovoj poškodovan
bg Не използвайте, ако опаковката е увредена
ro Nu utilizați dacă ambalajul e deteriorat
sk Nepoužívajte, ak je obal poškodený
tr Ambalaj hasarlısa kullanmayın
lt Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
lv Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
et Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada
ru Не использ., если упак. поврежд.
hr Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
sr Ne koristiti ako je omot oštećen



Mepilex® Border Flex

Self-adherent soft silicone foam dressing



For use on wounds.

The wound pad should overlap the dry surrounding skin by at least 1-2cm in order to protect the surrounding skin from maceration and to affix the dressing securely.

If used for prevention:

Assure that the wound pad covers the area at risk of pressure injury/tissue damage.

Mepilex Border Flex is a self-adherent, absorbent dressing that maintains a moist

wound environment. The waterproof outer layer protects the wound from dirt and bacteria.

The dressing has a Safetac® wound contact layer that is a unique adhesive technology.

It minimises pain to patients and trauma to wounds and the surrounding skin at dressing removal.

Mepilex Border Flex consists of:

- a wound contact layer consisting of soft silicone adhesive (Safetac) and a firm carrier
- a flexible absorbent pad in three layers; a foam, a non-woven spreading layer and a layer with super absorbent fibres; the wound pad is partly perforated with Flex cut technology
- an outer film which is breathable but waterproof, providing a barrier to external contaminants

Dressing material content:

Silicone, polyurethane, polyacrylate, cotton, viscose, polyester and polyolefin.

Indications for use

Mepilex Border Flex is designed for a wide range of exuding wounds such as pressure ulcers, leg and foot ulcers, traumatic wounds (e.g. skin tears), and surgical wounds. Mepilex Border Flex can also be used on dry/he/crotic wounds in combination with gels.

Mepilex Border Flex reduces postoperative blistering, and may also be used as part of a prophylactic therapy to help prevent skin damage, e.g. pressure ulcers.

Precautions

- Do not use on patients with known hypersensitivity to the ingoing materials/components of the product.
- Do not use together with oxidising agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide.
- If you see signs of infection e.g. fever or the wound or surrounding skin becoming red, warm or swollen, consult a health care professional for appropriate treatment.
- The use of dressings as part of a prophylactic therapy does not preclude the need to continue to develop and follow a comprehensive pressure ulcer prevention protocol, i.e. support surfaces, positioning, nutrition, hydration, skin care and mobility.
- Do not reuse. If reused performance of the product may deteriorate, cross contamination may occur.
- Sterile. Do not use if sterile barrier is damaged or opened prior to use. Do not re-sterilise.

Instructions for use

Mepilex Border Flex can be used by lay persons under supervision of health care professionals.

1. Select an appropriate dressing size/shape. When applicable, choose a dressing shape optimized for the specific anatomical site.

Disposal should be handled according to local environmental procedures.

Other information

The polyurethane foam used in the product may change colour to more yellow when it is exposed to light, air and/or heat. The colour change has no influence on product properties when used before expiry date.

If any serious incident has occurred in relation to the use of Mepilex Border Flex it should be reported to Mölnlycke Health Care.

Mepilex® and Safetac® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.





Mepilex® Border Flex

Weicher, selbsthaftender, silikonbeschichteter Schaumverband

Produktbeschreibung

Mepilex Border Flex ist ein selbsthaftender, absorbierender Verband, der ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Die wasserdichte äußere Schicht schützt die Wunde vor Schmutz und Bakterien. Der Verband verfügt über die einzigartige selbsthaftende Wundkontaktechicht, die Safetac® Technologie. Die Wundkontaktechicht minimiert Schmerzen beim Patienten sowie Traumata von Wunden und der wundumgebenden Haut beim Entfernen des Verbands.

Mepilex Border Flex besteht aus:

- einer Wundkontaktechicht aus haftendem weichem Silikon (Safetac) und einer Trägerfolie
- einem flexiblen, aus drei Schichten bestehenden Absorptionskissen: ein Schaum, eine Verteilerschicht aus Vlies und eine Schicht aus hochabsorbierenden Fasern die Wundauflage ist teilweise perforiert mit Flex-Cut Technologie
- einer atmungsaktiven und wasserdichten äußeren Folie, die eine Barriere gegen externe Kontamination bietet

Bestandteile des Verbandmaterials:

Silikon, Polyurethan, Polycrylat, Baumwolle, Viskose, Polyester und Polyolefin.

Anwendung/Indikation

Mepilex Border Flex ist für die Behandlung einer Vielzahl von exsudierenden Wunden geeignet, darunter Bein-, Fuß- oder Druckgeschwüre, traumatische Wunden (z. B. Hautrissse) sowie chirurgische Wunden. Außerdem eignet sich Mepilex Border Flex bei trockenen/nekrotischen Wunden in Kombination mit Gelen.

Mepilex Border Flex reduziert post-operative Spannungsblasen und kann auch als Teil einer prophylaktischen Therapie zur Prävention von Hautschäden, z. B. Druckgeschwüren, verwendet werden.

Vorsichtsmassnahmen

- Nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen die Vormaterialien/Bestandteile des Produkts verwenden.
- Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln, wie z. B. Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid, verwenden.
- Wenn Sie Anzeichen einer Infektion feststellen, z. B. Fieber oder gerötete, warme, geschwollene Wunde bzw. wundumgebende Haut, müssen Sie für eine angemessene medizinische Behandlung medizinisches Fachpersonal hinzuziehen.
- Die Verwendung von Verbänden als Teil einer präventiven Therapie ersetzt nicht die Entwicklung und Beachtung einer umfassenden Strategie zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und muss immer auch weitere Aspekte beinhalten, wie z. B. unterstützende Unterlagen, Lagerung, Ernährung, Feuchtigkeitsversorgung, Hauptpflege und Bewegung.
- Nicht wieder verwendbar. Die Leistungsfähigkeit des Produkts kann bei Wiederverwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.
- Steril. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn die sterile Barriere beschädigt ist oder die Verpackung vor Gebrauch bereits geöffnet wurde. Produkt nicht sterilisieren.

Gebrauchsanweisung

Mepilex Border Flex kann unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal auch von Laien verwendet werden.

1. Wählen Sie eine passende Verbandform und -größe. Wählen Sie bei Bedarf eine für den spezifischen anatomischen Bereich optimierte Verbandform.

Zur Verwendung auf Wunden:

Das Wundkissen sollte mindestens 1 bis 2 cm der trockenen umgebenden Haut bedecken, um die umgebende Haut vor Mazeration zu schützen und eine sichere Fixierung des Verbands zu gewährleisten.

Bei Verwendung zur Prävention:

Stellen Sie sicher, dass das Wundkissen den durch druckbedingte Verletzungen bzw. Gewebeschädigung gefährdeten Bereich vollständig abdeckt.

2. Zur Verwendung auf Wunden:

Reinigen Sie die Wunde gemäß den klinischen Standards. Trocknen Sie die wundumgebende Haut gründlich.

3. Entfernen Sie die erste Schutzfolie und legen Sie die haftende Seite auf die Wunde.

4. Entfernen Sie die restlichen Schutzfolien und streichen Sie den Haftrand auf der Haut glatt. Den Verband nicht überdehnen.

Mepilex Border Flex kann je nach Zustand der Wunde und der wundumgebenden Haut sowie gemäß der klinischen Praxis bis zu 7 Tage lang auf der Wunde verbleiben.

Zur Verwendung auf Wunden:

• Mepilex Border Flex kann auch unter Kompression verwendet werden.

• Da Mepilex Border Flex das feuchte Wundmilieu aufrechterhält, wodurch das Débridement unterstützt wird, kann die Wunde ggf. zunächst größer werden. Das ist normal und muss erwartet werden.

• Ein Wechsellauf einen anderen Verbandtyp kann ein anfängliches Zunehmen der Exsudatmenge zur Folge haben, so dass häufigere Verbandwechsel erforderlich werden.

Bei Verwendung zur Prävention:

Der druckgeschwür- bzw. gewebeschädigungsgefährdete Bereich sollte gemäß klinischer Praxis regelmäßig kontrolliert werden. Die Entsorgung sollte gemäß den lokalen Umweltschutzbedingungen erfolgen.

Weitere Informationen

Der in dem Produkt verwendete Polyurethanschaum kann eine gelbliche Farbe annehmen, wenn er Licht, Luft und/oder Hitze ausgesetzt wird. Der Farbwechsel hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften, wenn das Produkt vor dem Haltbarkeitsdatum verwendet wird.

Falls ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit Mepilex Border Flex aufgetreten ist, meiden Sie dies an Mölnlycke Health Care.

Mepilex® und Safetac® sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-fixant



Description du produit

Mepilex Border Flex est un pansement absorbant auto-fixant qui maintient la plaie en milieu humide. La couche externe imperméable protège la plaie des impuretés et des bactéries. Le pansement bénéficie d'une couche, côté plaie, d'enduction de silicone souple issue d'une technologie unique à base d'adhésif siliconé : la Technologie Safetac®. Elle minimise la douleur des patients et le traumatisme sur les plaies et la peau péri-lésionnelle lors du retrait du pansement.

Mepilex Border Flex est composé :

- d'une enduction de silicone souple (Safetac) et d'un film support;
- d'un coussin flexible et absorbant formé de trois couches : une mousse, un voile de diffusion en non tissé et une couche en fibres super absorbantes, le coussin du pansement bénéficie de la technologie Flex (découpes en Y);
- d'un film externe perméable à la vapeur et imperméable à l'eau, créant une barrière antimicrobienne.

Composition du pansement :

Silicone, polyuréthane, polyacrylate, coton, viscose, polyester et polyoléfine.

Indications

Mepilex Border Flex est indiqué pour le traitement de nombreuses plaies exsudatives, telles que les escarres, les ulcères de pied et de jambe, les plaies traumatiques (ex. déchirures cutanées) et les plaies chirurgicales. Mepilex Border Flex peut également être utilisé sur des plaies sèches/nécrosées, en association avec des gels.

Mepilex Border Flex peut être utilisé dans le cadre d'un traitement prophylactique en prévention de lésions cutanées (ex. escarres, phlyctènes postopératoires).

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants.
- Ne pas utiliser le pansement avec des agents oxydants, tels que les solutions d'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène.
- En cas de signes cliniques d'infection, par exemple en présence de fièvre ou si la plaie ou la peau péri-lésionnelle devient rouge, chaude ou gonflée, consulter un professionnel de santé qui prescrira un traitement anti-infectieux approprié.
- L'utilisation de pansements dans le cadre d'un traitement prophylactique n'exclut pas la prise en charge standard de prévention des escarres, c.-à-d. supports adaptés, positionnement, alimentation, hydratation, soins de la peau et mobilité.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.

Mode d'emploi

Mepilex Border Flex peut être utilisé par des particuliers sous la supervision de professionnels de santé.

1. Sélectionner une taille/forme de pansement appropriée. Le cas échéant, choisir une forme de pansement optimisée pour le site anatomique spécifique.

Pour une utilisation sur des plaies :

Choisir la taille de Mepilex Border Flex appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau péri-lésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.

Pour une utilisation préventive :

S'assurer que le coussin du pansement couvre la zone présentant un risque d'escarre ou de lésion tissulaire.

2. Pour une utilisation sur des plaies :

Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur. Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle.

3. Retirer le premier feuillet protecteur et appliquer face adhérente sur la plaie.

4. Retirer le feuillet protecteur restant, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.

Mepilex Border Flex peut rester en place pendant 7 jours, en fonction de l'état de la plaie et de la peau péri-lésionnelle ou conformément aux protocoles de soins en vigueur.

Pour une utilisation sur des plaies :

- Mepilex Border Flex peut être utilisé sous compression.
- Dans la mesure où Mepilex Border Flex maintient un milieu humide au niveau de la plaie, ce qui facilite la détersion, une augmentation de la taille de la plaie peut d'abord être observée. Il s'agit d'un phénomène normal et attendu.
- La modification du type de pansement peut conduire dans un premier temps à l'augmentation de la quantité d'excès d'humidité. Un renouvellement plus fréquent du pansement pourrait donc s'avérer temporairement nécessaire.

Pour une utilisation préventive :

La zone présentant un risque d'escarre ou de lésion tissulaire doit être inspectée à intervalles réguliers, conformément aux protocoles de soins en vigueur.

L'élimination doit être effectuée conformément aux procédures environnementales en vigueur.

Informations complémentaires

La mousse de polyuréthane contenue dans le pansement peut jaunir en cas d'exposition à la lumière, à l'air et/ou à la chaleur. Le changement de couleur n'a pas d'influence sur les propriétés du produit lorsque ce dernier est utilisé avant la date de péremption.

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du pansement Mepilex Border Flex, le signaler à Mölnlycke Health Care.

Mepilex® et Safetac® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Apósito autoadhesivo de espuma cubierto de suave silicona

- Estéril. No lo utilice si la barrera estéril está dañada o abierta antes de su uso.
No lo reutilice de nuevo.



Descripción del producto

Mepilex Border Flex es un apósito autoadhesivo y absorbente que mantiene un nivel de humedad óptimo en el lecho de la lesión. La capa exterior impermeable protege la lesión de la suciedad y las bacterias. El apósito cuenta con una capa de contacto con la herida Safetac®, una tecnología adhesiva exclusiva. Minimiza el dolor de los pacientes y el traumatismo en las heridas y la piel perilesional durante la retirada del apósito.

El apósito Mepilex Border Flex está formado por:

- una capa de contacto con la lesión formada por un adhesivo cubierto de suave silicona (Safetac) y un film
 - una almohadilla flexible y absorbente con tres capas; una espuma, una capa expansiva de tejido no tejido y otra capa de fibras superabsorbentes (la almohadilla está parcialmente perforada mediante la tecnología Flex)
 - un film exterior, transpirable pero impermeable, que ofrece una barrera contra los contaminantes externos
- Contenido del material del apósito:
- Silicona, poliuretano, poliacrilato, algodón, viscosa, poliéster y poliolefina.
- Indicaciones de uso
- El apósito Mepilex Border Flex está diseñado para una amplia variedad de lesiones con exudado, como úlceras por presión, úlceras en pies y piernas, lesiones traumáticas (p. ej., desgarros de la piel) y heridas quirúrgicas. El apósito Mepilex Border Flex también se puede utilizar en lesiones secas o necróticas, en combinación con geles.
- El apósito Mepilex Border Flex reduce las ampollas posoperatorias y también se puede utilizar como parte de una terapia profiláctica para ayudar a evitar lesiones cutáneas, como las úlceras por presión.

Instrucciones de uso

Los legos pueden utilizar Mepilex Border Flex bajo supervisión de profesionales sanitarios.

1. Seleccione un tamaño / una forma de apósito adecuado/a. Cuando proceda, elija una forma de apósito adecuada para la cavidad anatómica específica.
- Para el uso en lesiones:
- La almohadilla deberá sobresalir al menos 1-2 cm del borde de la piel perilesional seca para proteger la piel perilesional de la maceración y fijar el apósito de forma segura.

- una usa como prevención:
Asegúrese de que la almohadilla cubre la zona con riesgo de lesión por presión o daños en los tejidos.
2. Para el uso en lesiones:
Lave la herida según la práctica clínica. Seque bien la piel perilesional.

3. Retire la primera película protectora y coloque el lado adhesivo sobre la lesión.
 4. Retire el resto de papeles protectores y alise el borde sobre la piel. No estre el producto.
Puede dejar el apósito Mepilex Border Flex sobre la lesión hasta un máximo de 7 días, en función del estado de la lesión y de la piel perilesional, o según las indicaciones del médico.
- Para el uso en lesiones:
- El apósito Mepilex Border Flex puede utilizarse bajo vendajes de compresión.

- Dado que el Mepilex Border Flex mantiene húmedo el entorno de la lesión, lo cual favorece el desbridamiento, el tamaño de la herida puede aumentar al principio. Es normal que esto ocurra.
 - Un cambio en la forma de utilización del apósito puede aumentar el nivel de exudado, lo que puede conllevar un aumento temporal en la frecuencia de cambio.
- Si se usa como preventión:
Debe inspeccionarse periódicamente la zona con riesgo de úlcera por presión / daños de los tejidos según las indicaciones del médico.
- Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales.

Otra información

- El color de la espuma de poliuretano empleada en el producto puede volverse más amarillo si se expone a la luz, al aire y/o al calor. Este cambio de color no repercutirá en las propiedades del producto mientras se utilice antes de la fecha de caducidad.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el uso de Mepilex Border Flex debe ser notificado a Mölnlycke Health Care.

Mepilex® y Safetac® son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB.

Precauciones

- No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad diagnosticada a los materiales/componentes entrantes del producto.
- No utilice este apósito junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Si observa signos de infección, como fiebre, enrojecimiento, calentamiento o hinchazón de la herida o la piel perilesional, consulte a un profesional sanitario para que le indique un tratamiento adecuado.
- El uso de los apóstitos como parte de la terapia profiláctica no descarta la necesidad de continuar con el protocolo de prevención de úlceras por presión, es decir, superficies de soporte, posiciones, nutrición, hidratación, cuidado de la piele y movilidad.
- No reutilice el apósito. En caso de reutilización, puede empeorar el rendimiento del producto y pueden producirse casos de contaminación cruzada.

Mepilex® Border Flex

Zelfklevend zacht siliconenschuimverband



Productomschrijving

Mepilex Border Flex is een zelfklevend, absorberend verband dat een vochtige wondomgeving handhaaft. De waterbestendige buitenlaag beschermt de wond tegen vuil en bacteriën. Het verband heeft een Safetac® wondcontactlaag. Dat is een unieke zelfklevende technologie. Het minimaliseert pijn voor patiënten en trauma voor wonden en de omliggende huid bij verwijdering van het verband.

Mepilex Border Flex bestaat uit:

- een wondcontactlaag bestaande uit zacht silicone adhesielaaag (Safetac) en een filmlaag;
- een flexibel, absorberend wondkussen met drie lagen: schuim, een non-woven verspreidingslaag en een laag met superabsorberende vezels; het wondkussen is gedeeltelijk geperforeerd op basis van Flex-technologie;
- een buitenlaag die ademend maar waterbestendig is, en zo een barrière vormt tegen besmettingen van buitenaf.

Het verbandmateriaal bevat:

silicone, polyurethaan, polycrylaat, katoen, viscose, polyester en polyolefin.

Indicaties voor gebruik

Mepilex Border Flex is bedoeld voor een brede variëteit aan exsuderende wonden, zoals decubitus, been- en voetulcera, traumatische wonden [bv. huidscheuren of skin tears] en chirurgische wonden. Mepilex Border Flex kan ook worden toegepast in combinatie met gels op droge/necrotische wonden. Mepilex Border Flex vermindert postoperatieve blaarvorming en kan ook worden gebruikt als onderdeel van een profylactische behandeling ter voorkoming van huidbeschadiging, zoals decubitus.

Voorzorgsmaatregelen

- Het verband niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor het verband of de bestanddelen ervan.
- Niet gebruiken in combinatie met oxiderende middelen, zoals hypochlorietoplossingen of waterstofperoxide.
- Bemerkt u tekenen van infectie, bv. koorts of een rode, warme of gezwollen wond of omliggende huid, neem dan contact op met een zorgverlener voor gepaste behandeling.
- Het gebruik van verbanden als onderdeel van een profylactische behandeling betekent niet dat er geen uitgebreid protocol ter voorkoming van decubitus moet worden ontwikkeld en gevolgd, waarin onder meer steunvlakken, positionering, voeding, hydratatie, huidverzorging en mobiliteit moeten worden opgenomen.
- Niet opnieuw gebruiken. Bij hergebruik kan de werking van het product verslechteren en kan er kruisbesmetting optreden.
- Steriel. Niet gebruiken als de binnenverpakking is beschadigd of vóór gebruik is geopend. Niet opnieuw steriliseren.

Gebruiksaanwijzing

Mepilex Border Flex kan door leken onder toezicht van zorgverleners worden gebruikt.

1. Kies een verband in de juiste maat en vorm. Kies indien mogelijk een verbandvorm die is geoptimaliseerd voor het specifieke anatomische gebied.

Voor gebruik op wonden:

Het wondkussen moet de droge huid rondom de wond minimaal 1-2 cm overlappen om de omliggende huid te beschermen tegen verwekking en om het verband goed te fixeren.

Indien gebruikt ter preventie:

Zorg ervoor dat het wondkussen het gebied waar decubitus en/of weefselschade kan optreden, goed bedekt.

2. **Voor gebruik op wonden:**

Reinig de wond volgens de gangbare klinische praktijk. Droog de omliggende huid goed.

3. Verwijder het eerste schutblad en breng de kleefzijde aan op de wond.

4. Verwijder de andere schutbladen en strijk de randen op de huid glad. Rek het verband niet uit.

Mepilex Border Flex kan maximaal 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de toestand van de wond en de omliggende huid en de klinische praktijk.

Voor gebruik op wonden:

- Mepilex Border Flex kan worden gebruikt onder een drukverband.

- Omdat Mepilex Border Flex de wond vochtig houdt en zo debridement ondersteunt, kan de omvang van de wond in eerste instantie toenemen. Dit is normaal en kan worden verwacht.

- Een wijziging in de verbandbehandeling kan ertoe leiden dat het exsudaatniveau aanvankelijk toeneemt, waardoor het verband tijdelijk vaker moet worden verwisseld.

Indien gebruikt ter preventie:

Het gebied waar decubitus en weefselschade kan optreden, moet op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd volgens de gangbare praktijk.

Afvalverwerking moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften.

Overige informatie

Het polyurethaanschuim dat voor het verband wordt gebruikt, kan geler worden als het wordt blootgesteld aan licht, lucht en/of warmte. De kleurverandering verandert de producteigenschappen niet als het verband wordt gebruikt vóór de uiterste vervaldatum.

Als er een ernstig incident in verband met het gebruik van Mepitel Border Flex is opgetreden, moet dit worden gemeld aan Mölnlycke Health Care.

Mepilex® en Safetac® zijn gedeponeerde handelsmerken van Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Självhäftande skumförband med mjuk silikon



Produktbeskrivning

Mepilex Border Flex är ett självhäftande, absorberande förband som bibehåller en fuktig sårmiljö. Det vattenläta ytter lagret skyddar såret mot smuts och bakterier. Förbandet har ett sårkontaktlager med Safetac®, vilket är en unik vidhäftningsteknologi. Det minskar smärta hos patienter och vävnadsskada i sår och på omkringliggande hud vid avlägsnande av förbandet.

Mepilex Border Flex består av:

- ett sårkontaktlager som består av mjuk självhäftande silikon [Safetac] och en film
- en flexibel absorberande dyna med tre lager: ett skumlager, ett nonwoven-lager och ett lager med superabsorberande fibrer; sårdynan är delvis perforerad med Flex Cut-teknologi
- en baksidesfilm som andas men är duscharbar och ogenomtränglig utifrån, vilket skapar en barriär mot extern kontamination

Innehåll i förbandsmaterialet:

Silikon, polyuretan, polyakrylat, bomull, viskos, polyester och polyolefin.

Indikationer

Mepilex Border Flex kan användas på ett stort antal vätskande sår såsom trycksår, ben- och fotstårs, traumatiska sår [t.ex. hufdflikar] och kirurgiska sår. Mepilex Border Flex kan också användas på torra/nekrotiska sår tillsammans med gel.

Mepilex Border Flex minskar postoperativ blåsbildning och kan även användas som en del av en förebyggande behandling för att förhindra hudskada, t.ex. trycksår.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte på patienter med känd överkänslighet mot ingående material/komponenter i produkten.
- Använd inte tillsammans med oxiderande ämnen såsom hypokloritlösningar eller väteperoxid.
- Om du ser tecken på infektion, t.ex. feber eller att såret eller omgivande hud blir röd, varm eller svullen ska du rådfråga vårdpersonal om lämplig behandling.
- Användningen av förband som en del av en förebyggande behandling utesluter inte behovet att fortsätta att utveckla och följa ett omfattande protokoll för trycksårsprevention, dvs. stödytor, placering, näring, hydrering, hudvård och rörlighet.
- Får ej återanvändas. Om produkten återanvänts kan den ha nedsatt effekt och korskontaminering kan förekomma.
- Steril. Använd inte produkten om den sterila barriären är skadad eller öppnad före användning. Får ej omsteriliseras.

Bruksanvisning

Mepilex Border Flex kan användas av lekmän under övervakning av kvalificerad vårdpersonal.

1. Välj en lämplig storlek/form på förbandet. Välj, om tillämpligt, en form på förbandet som är optimerad för den specifika anatomin.

För användning på sår:

Sårdynan bör överlappa den torra omkringliggande huden med minst 1–2 cm för att skydda huden mot maceration och för att fixera förbandet på ett säkert sätt.

Vid användning i förebyggande syfte:

Se till att sårdynan täcker trycksårets/vävnadsskadans riskområde.

2. För användning på sår:

Rengör såret i enlighet med kliniska rutiner. Torka den omkringliggande huden noggrant.

3. Ta bort den översta skyddsfilmen och applicera den vidhäftande sidan mot såret.

4. Ta bort de återstående skyddspapperen och jämna ut kanten över huden. Sträck inte.

Mepilex Border Flex kan lämnas på såret i upp till sju dagar beroende på sårets och omkringliggande huds tillstånd, eller enligt gängse kliniska rutiner.

För användning på sår:

- Mepilex Border Flex kan användas under kompressionsbehandling.

- Eftersom Mepilex Border Flex bevarar en fuktig sårmiljö som främjar debridering, kan sårets storlek öka initialt. Detta är normalt och förväntas inträffa.

- Vid byte av behandling och förbandstyp kan det initialt leda till ökad mängd sårsekret, som temporärt kan kräva tätare frekvens på förbandsbyten.

Vid användning i förebyggande syfte:

Trycksårets/vävnadsskadans riskområde ska inspekteras med jämna mellanrum i enlighet med kliniska rutiner.

Avfall ska hanteras enligt lokala miljörutiner.

Övrig information

Polyuretanskummet som används i produkten kan ändra färg till en mer gul nyans när det exponeras för ljus, luft och/eller värme. Färgförändringen påverkar inte produktens egenskaper när detta används före utgångsdatum.

Om en allvarlig incident med koppling Mepilex Border Flex inträffar ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care.

Mepilex® and Safetac® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.



Mepilex® Border Flex

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato di contatto in silicone morbido

Descrizione del prodotto

Mepilex Border Flex è una medicazione assorbente aderente che mantiene un ambiente umido. Lo strato esterno impermeabile protegge la lesione da sporco e batteri. La medicazione è dotata di uno strato di contatto basato sull'esclusiva tecnologia Safetac®, che riduce al minimo il dolore del paziente e il trauma sulla lesione e sulla cute perilesionale quando la medicazione viene rimossa.

Mepilex Border Flex è composto da:

- uno strato a contatto con la ferita in morbido silicone [Safetac] e una pellicola protettiva in film
- un tamponcino lessibile assorbente composto da tre strati: una schiuma di poliuretano, uno strato di diffusione in tessuto non tessuto e uno strato in fibre superassorbenti; il tamponcino è parzialmente fessurato grazie all'utilizzo della tecnologia Flex cut, che lo rende flessibile
- un film esterno, traspirante ma impermeabile, che fornisce una barriera per i contaminanti esterni.

Materiali che compongono la medicazione:

Silicone, poliuretano, poliacrilato, cotone, viscosa, poliestere e poliolefine.

Istruzioni per l'uso

Mepilex Border Flex può essere usato da qualsiasi caregiver sotto la supervisione del personale sanitario.

1. Selezionare la forma/dimensione idonea della medicazione. Quando possibile, scegliere una forma ottimizzata per la specifica area anatomica.

Utilizzo su lesioni

Il tamponcino deve estendersi per almeno 1-2 cm oltre la lesione in modo da proteggere la cute perilesionale dalla macerazione e fissare la medicazione in modo sicuro.

Utilizzo in preventzione:

Verificare che il tamponcino copra l'area a rischio di sviluppo di un'ulcera da pressione/ danneggiamento cutaneo.

2. Utilizzo su lesioni

Pulire la ferita secondo i normali protocolli clinici. Asciugare con cura la cute perilesionale.

3. Rimuovere la prima pellicola di protezione e applicare la medicazione sulla ferita.

4. Rimuovere le pellicole rimanenti e distendere il bordo sulla cute. Non tendere la medicazione.

Mepilex Border Flex può essere lasciato in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della lesione e della cute perilesionale, o secondo quanto indicato dai normali protocolli clinici.

Utilizzo su lesioni:

• Mepilex Border Flex può essere utilizzato sotto bendaggi compressivi.

• Poiché Mepilex Border Flex mantiene l'ambiente umido, favorendo il debridement, si potrebbe verificare un'iniziale estensione delle dimensioni della lesione. Questo effetto è del tutto normale. Inizialmente può essere necessario cambiare la medicazione con maggiore frequenza, perché una modifica del trattamento può determinare un aumento iniziale dell'essudato.

Utilizzo in preventione:

L'area a rischio di ulcera da pressione/danneggiamento cutaneo deve essere spazzinata a intervalli regolari come indicato dai normali protocolli clinici. Il relativo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle procedure locali in materia di tutela dell'ambiente.

Altre informazioni

La schiuma di poliuretano utilizzata nel prodotto può cambiare colore ingiallendo quando viene esposta a luce, aria e/o calore. La variazione di colore non influenza le proprietà del prodotto, se utilizzato entro la data di scadenza.

Eventuali gravi incidenti in relazione a Mepilex Border Flex devono essere riferiti a Mölnlycke Health Care.

Mepilex® e Safetac® sono marchi registrati di Mölnlycke Health Care AB.



Istruzioni per l'uso

Mepilex Border Flex può essere usato da qualsiasi caregiver sotto la supervisione del personale sanitario.

1. Selezionare la forma/dimensione idonea della medicazione. Quando possibile, scegliere una forma ottimizzata per la specifica area anatomica.

Utilizzo su lesioni

Il tamponcino deve estendersi per almeno 1-2 cm oltre la lesione in modo da proteggere la cute perilesionale dalla macerazione e fissare la medicazione in modo sicuro.

Utilizzo in preventzione:

Verificare che il tamponcino copra l'area a rischio di sviluppo di un'ulcera da pressione/ danneggiamento cutaneo.

2. Utilizzo su lesioni

Pulire la ferita secondo i normali protocolli clinici. Asciugare con cura la cute perilesionale.

3. Rimuovere la prima pellicola di protezione e applicare la medicazione sulla ferita.

4. Rimuovere le pellicole rimanenti e distendere il bordo sulla cute. Non tendere la medicazione.

Mepilex Border Flex può essere lasciato in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della lesione e della cute perilesionale, o secondo quanto indicato dai normali protocolli clinici.

Utilizzo su lesioni:

• Mepilex Border Flex può essere utilizzato sotto bendaggi compressivi.

• Poiché Mepilex Border Flex mantiene l'ambiente umido, favorendo il debridement, si potrebbe verificare un'iniziale estensione delle dimensioni della lesione. Questo effetto è del tutto normale. Inizialmente può essere necessario cambiare la medicazione con maggiore frequenza, perché una modifica del trattamento può determinare un aumento iniziale dell'essudato.

Utilizzo in preventione:

L'area a rischio di ulcera da pressione/danneggiamento cutaneo deve essere effettuata in conformità alle procedure locali in materia di tutela dell'ambiente.

Altre informazioni

La schiuma di poliuretano utilizzata nel prodotto può cambiare colore ingiallendo quando viene esposta a luce, aria e/o calore. La variazione di colore non influenza le proprietà del prodotto, se utilizzato entro la data di scadenza.

Eventuali gravi incidenti in relazione a Mepilex Border Flex devono essere riferiti a Mölnlycke Health Care.

Mepilex® e Safetac® sono marchi registrati di Mölnlycke Health Care AB.



Istruzioni per l'uso

Mepilex Border Flex può essere usato da qualsiasi caregiver sotto la supervisione del personale sanitario.

1. Selezionare la forma/dimensione idonea della medicazione. Quando possibile, scegliere una forma ottimizzata per la specifica area anatomica.

Utilizzo su lesioni

Il tamponcino deve estendersi per almeno 1-2 cm oltre la lesione in modo da proteggere la cute perilesionale dalla macerazione e fissare la medicazione in modo sicuro.

Utilizzo in preventzione:

Verificare che il tamponcino copra l'area a rischio di sviluppo di un'ulcera da pressione/ danneggiamento cutaneo.

2. Utilizzo su lesioni

Pulire la ferita secondo i normali protocolli clinici. Asciugare con cura la cute perilesionale.

3. Rimuovere la prima pellicola di protezione e applicare la medicazione sulla ferita.

4. Rimuovere le pellicole rimanenti e distendere il bordo sulla cute. Non tendere la medicazione.

Mepilex Border Flex può essere lasciato in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della lesione e della cute perilesionale, o secondo quanto indicato dai normali protocolli clinici.

Utilizzo su lesioni:

• Mepilex Border Flex può essere utilizzato sotto bendaggi compressivi.

• Poiché Mepilex Border Flex mantiene l'ambiente umido, favorendo il debridement, si potrebbe verificare un'iniziale estensione delle dimensioni della lesione. Questo effetto è del tutto normale. Inizialmente può essere necessario cambiare la medicazione con maggiore frequenza, perché una modifica del trattamento può determinare un aumento iniziale dell'essudato.

Utilizzo in preventione:

L'area a rischio di ulcera da pressione/danneggiamento cutaneo deve essere effettuata in conformità alle procedure locali in materia di tutela dell'ambiente.

Altre informazioni

La schiuma di poliuretano utilizzata nel prodotto può cambiare colore ingiallendo quando viene esposta a luce, aria e/o calore. La variazione di colore non influenza le proprietà del prodotto, se utilizzato entro la data di scadenza.

Eventuali gravi incidenti in relazione a Mepilex Border Flex devono essere riferiti a Mölnlycke Health Care.

Mepilex® e Safetac® sono marchi registrati di Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Itsekiinnityvä pehmä silikonivahtosidos



Tuotekuvaus

Mepilex Border Flex itsekiinnityvä, imukykinen sidos, joka ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. Vedenpitävä ulommainen kerros suojaa haavaa lialta ja bakteereilta. Sidoksessa on haavan kontaktipintana ainutlaatuinen Safetac®-kiinnitymisteknologia. Se vähentää potilaan tuntemaa kipua sekä haavalle sekä sitä ympäröivälle iholle aiheutuvia vaurioita sidoksen vaihdon yhteydessä.

Mepilex Border Flex koostuu

- pehmeästä silikonesta ja kiinnityvästä haavan kontaktipinnasta (Safetac) ja kalvosta
- joustavasta, imukykyisestä kolmikerroksisesta haavatyynystä: vaalto, kuitukankainen levittävä kerros ja superimukykyisiä kuituja sisältävä kerros, haavatyyny on osittain rei'itetty Flex-leikkuuteknikkaa käytäen,
- hengittävästä mutta vedenpitävästä ulkokerroksesta, joka suojaa ulkoisilta epäpuhauksilta

Sidomsateriaalit:

Silikoni, polyuretaani, polyakrylaatti, puuvilla, viskoosi, polyesteri ja polyolefioni.

Käyttöalueet

Mepilex Border Flex sopii hyvin monenlaisiin erittäviin haavoihin, esimerkiksi painehaavoihin, sääri-ja jalkahaavoihin sekä traumatiisiin haavoihin, esim. ihon repeämään ja leikkaushaavoihin. Mepilex Border Flex -sidosta voidaan käyttää myös kuivissa/nekrootisissa haavoissa yhdessä geelien kanssa.

Mepilex Border Flex -sidos estää postoperatiivisten rakkuloiden syntyä, ja sitä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevän hoidon osana ihovauroiden, esim. painehaavojen estämisessä.

Huomiointavaa

- Ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan allergisia tuotteen materiaaleille/komponenteille.
- Älä käytä yhdessä haptettavien aineiden, kuten hypokloriittiiluosten tai vetyperoksidin, kanssa.
- Jos havaitset infektion merkkejä, esim. potilaalle nousee kuumetta tai haava on muuttumassa punaiseksi, lämpimäksi tai turvonneeksi, ota yhteystä terveydenhuollon ammattilaiseen asianmukaista hoitoa varten.
- Sidosten käyttö osana ennaltaehkäisevää hoitoa ei sulje pois tarvetta edelleen kehittää ja noudattaa perusteellista painehaavojen ehkäisykäytäntöä, jossa huomioidaan alustat, asennon vahittaminen, ravisemus, nesteetyys, iholensoito ja liikkuminen.
- Älä käytä tuotetta uudelleen. Uudelleen käytettäessä tuotteen toimintakyky voi heikentyä ja ristikontaminaatiota esiintyä.
- Sterili. Tuotetta ei saa käyttää, jos sterili sisäpakkauks on vaurioitunut tai avattu ennen käyttöä. Älä steriloi uudelleen.

Käyttöohjeet

Maalikot voivat käyttää Mepilex Border Flex -sidosta terveydenhoidon ammattilaisten valvonnassa.

1. Valitse sopiva sidoksen koko/muoto. Valitse tietylle anatomiselle alueelle tarkoitettu sidos, mikäli sellainen on saatavilla.

Käyttö haavoille:

Haavatyyn tulisi ulottua vähintään 1 - 2 cm ympäröivän kuivan ihon reunojen yli ympäröivän ihan suojaamiseksi maseraatiolta ja sidoksen kiinnittämiseksi tukevasti.

Käyttö ennaltaehkäisyyn:

Valitse sidos, joka peittää alueen, jolla on olemassa painehaavojen/kudosvauroiden riski.

2. Käyttö haavoille:

Puhdistaa haava klinisen käytännön mukaisesti. Kuivaa haavaa ympäröivä iho perusteellisesti.

3. Irrota ensimmäinen suojakalvo ja aseta kiinnityvä puoli haavaan.

4. Poista loput suojarerät ja silitä reuna tasaisesti iholle. Älä venytä.

Mepilex Border Flex voidaan jättää paikalleen enintään 7 päivän ajaksi haavan ja ympäröivän ihan kunnan mukaan tai klinisen käytännön mukaisesti.

Käyttö haavoille:

- Mepilex Border Flex -sidosta voidaan käyttää kompressiosidosten alla.
- Koska Mepilex Border Flex ylläpitää kosteaa haavaympäristöä edesauttaen puhdistumista, haavan koko saattaa aluksi suurentua. Tämä on normaalista ja odotettavissa.
- Sidos saatetaan joutua vaihtamaan aluksi useammin siksi, että hoidon muutos voi aiheuttaa aluksi erityksen lisääntymistä.

Käyttö ennaltaehkäisyyn:

Painehaavoille/kudosvaarioille alittiina oleva alue tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin klinisen käytännön mukaisesti.

Hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristömääräysten mukaan.

Muuta tietoa

Tuotteessa käytetty polyuretaanivahto voi muuttua väriiltään keltaisemmaksi altistuessaan valolle, ilmalle ja/tai kuumuudelle. Värinmuutos ei vaikuta tuotteen ominaisuuksiin, kun tuote käytetään ennen viimeistä käyttöpäivää.

Jos Mepilex Border Flex -sidoksen käytön yhteydessä ilmenee vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle.

Mepilex® ja Safetac® ovat Mölnlycke Health Care AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mepilex® Border Flex

Penso autoaderente em espuma de silicone suave

Descrição do produto

O Mepilex Border Flex é um penso autoaderente, absorvente que mantém a humidade do local da ferida. A camada exterior à prova de água protege a ferida da sujidade e bactérias. O penso possui uma camada de contacto com a ferida Safetac®, uma tecnologia única de aderência que minimiza a dor nos doentes e o trauma nas feridas e na pele circundante aquando da remoção do penso.

O Mepilex Border Flex é composto por:

- uma camada de contacto com a ferida constituída por um adesivo de silicone suave (Safetac) e uma película de suporte
- um corpo absorvente e flexível em três camadas: uma espuma, uma camada de expansão de tecido não tecido e uma camada com fibras super absorbentes; o corpo é parcialmente perfurado com a tecnologia a te corte Flex
- uma película exterior respirável mas à prova de água, fornecendo uma barreira contra contaminantes externos

Composição do material dos pensos:

Silicone, poliuretano, poliacrilato, algodão, viscose, poliéster e poliolefina.

Indicações de utilização

O Mepilex Border Flex foi concebido para uma vasta gama de feridas com exsudado, tais como úlceras de pressão, úlceras das pernas e dos pés, feridas traumáticas (por exemplo, fissuras da pele) e feridas cirúrgicas. O Mepilex Border Flex também pode ser utilizado em feridas secas/necróticas em combinação com géis.

O Mepilex Border Flex reduz as bolhas pós-operatórias e também pode ser utilizado como parte de uma terapia profilática para ajudar a evitar danos na pele, por exemplo, úlceras de pressão.

Precauções

- Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos materiais/componentes do produto.
- Não utilizar em conjunto com agentes oxidantes, tais como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogénio.
- Se identificarem sinais de infecção, por exemplo, febre, vermelhidão da ferida ou da pele circundante, subida da temperatura ou edema, consulte um profissional de cuidados de saúde para obter um tratamento adequado.
- A utilização de pensos como parte de uma terapêutica profilática não exclui a necessidade de continuar a desenvolver e seguir um protocolo de prevenção de úlceras de pressão completo ou seja, superfícies de apoio, posicionamento, nutrição, hidratação, cuidados da pele e mobilidade.
- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.
- Estéril. Não utilizar caso a barreira estéril esteja danificada ou aberta antes da utilização.
- Não volte a esterilizar.

Instruções de utilização

O Mepilex Border Flex pode ser utilizado por leigos sob a supervisão de profissionais de cuidados de saúde.

1. Escolha um tamанho/forma de penso adequado. Escolha um formato de penso otimizado para o local anatómico específico, se aplicável.

Para utilização em feridas:

O penso para feridas deve exceder a pele seca circundante em, pelo menos, 1-2 cm, de modo a proteger a pele circundante da maceração e garantir a correta fixação do penso.

Se utilizado para fins de prevenção:

Certifique-se de que o penso para feridas cobre a área em risco de lesão por pressão/danños nos tecidos.

2. Para utilização em feridas:
Lime a ferida de acordo com a prática clínica. Seque bem a pele circundante.

3. Retire a película protetora inicial e aplique o lado aderente na ferida.

4. Retire as restantes películas de proteção e alise a margem adesiva na pele. Não estique.

O Mepilex Border Flex pode permanecer no local até 7 dias, dependendo do estado da ferida e da pele circundante ou conforme indicado pela prática clínica.

Para utilização em feridas:

- O Mepilex Border Flex pode ser utilizado sob ligaduras de compressão.

- Uma vez que o Mepilex Border Flex mantém um ambiente húmido no local da ferida, o que ajuda o desbridamento, pode ocorrer um aumento inicial do tamanho da ferida. Esta é uma ocorrência normal e esperada.
- Uma mudança no regime de aplicação do penso pode resultar num aumento inicial do nível de exsudado, o que poderá, temporariamente, exigir uma maior frequência de mudança.

Se utilizado para fins de prevenção:
A área em risco de úlcera de pressão/danos nos tecidos deve ser verificada em intervalos regulares de acordo com a prática clínica.

A eliminação deverá atender aos procedimentos ambientais locais.

Outras informações

A espuma de poliuretano utilizada no produto poderá mudar de cor, para mais amareloado, quando exposta à luz, ao ar e/ou ao calor. A alteração na cor não influencia as propriedades do produto quando utilizado antes da data de validade.

Caso tenha ocorrido algum incidente grave relacionado com o Mepilex Border Flex, deverá ser comunicado à Mölnlycke Health Care.

Mepilex® e Safetac® são marcas registadas da Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Sektklæbende skumbandage med blød silikone

Brugervejledning

Mepilex Border Flex kan bruges til ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.
1. Vælg en passende bandagesstørrelse/-form. Vælg om nødvendigt en bandageform, der er optimert til det pågældende anatomiske sted.

Produktbeskrivelse

Mepilex Border Flex er en sektklæbende, absorberende bandage, der oprettholder et fugtigt såhelingssmiljø. Det vandhætte yderlag beskytter såret mod snuds og bakterier. Bandagen har et Safetac®-sårkontaktagt, som er en unik klæbekonstnologi. Det minimerer smerte hos patienterne og træume mod såret og den omkringliggende hud ved bandagesskift.

Mepilex Border Flex består af:

- et sårkontaktagt bestående af blød, seklyklæbende silikone [Safetac] og et bærende lag af film
 - en fleksibel, absorberende pude med tre lag: et skum, et nonwoven spredningslag og et lag med superabsorberende fibre. Såpuden er delvist perforeret vha. Flex-cut-teknologi
 - en filmbagside, der er åndbar, men vandtæt, som yder en barriere mod udsætra kommande urenheder
- Materialeindhold:
- Silikone, polyuretan, polyakrylat, bomuld, viskose, polyester og polyolefin.

Anvendelsesområde

Mepilex Border Flex er udviklet til en bred vifte af væskende sår såsom tryksår, ben- og fodsår, traumatiske sår (f.eks. ritter) og operationssår. Mepilex Border Flex kan også anvendes på tørre/nekrotiske sår sammen med gelier.

Mepilex Border Flex reducerer postoperativt blæredannelse og kan også bruges som led i en protokolstrik behandling, hvor produktet er med til at forhindre hudskader som f.eks. tryksår.

Førholdsregler

- Bandagen må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for de materialer/ komponenter, der indgår i produktet.
- Må ikke bruges sammen med oxidérende midler som f.eks. hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.
- Hvis der optræder tegn på infektion, f.eks. feber eller at såret bliver rødt, varmt eller hævet, skal du kontakte sundhedsafagligt personale vedrørende passende behandling.
- Brugen af bandager som led i en protokolstrik behandling udelukker ikke behovet for at følge en forebyggelsesprotokol for tryksår, dvs. aflastning, forlystning, ermæring, hydrering, hulpleje og mobilitet.
- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget eller har været åbnnet før anvendelse. Må ikke resteriliseres.



Såpuden skal overlæppe den tørre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm, således at den omkringliggende hud beskyttes mod maceration, og bandagen sidder godt fast.

Ved anvendelse på sår:

1. Vælg en passende bandagesstørrelse/-form. Vælg om nødvendigt en bandageform, der er optimert til det pågældende anatomiske sted.
2. Ved anvendelse på sår:
 - Rens såret i henhold til de kliniske reningslinjer. Tør den omkringliggende hud grundigt.
 - 3. Fjern den første beskyttelsesfilm, og aplicerer bandagen med den klæbende side mod såret.
 - 4. Fjern de resterende beskyttelsesfilm, og udglat produktet mod huden. Stræk ikke bandagen.
5. Mepilex Border Flex kan blive siddende i op til sy dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand eller i henhold til de kliniske reningslinjer.

Ved anvendelse på sår:

1. Sørg for, at såpuden dækker det område, hvor der er risiko for tryksår/væskskade.
2. Ved anvendelse på sår:
 - Meplix Border Flex kan anvendes under kompressionsbandager.
 - Da Meplix Border Flex bevarer et fugtigt såhelingssmiljø, som understøtter oprensning af såret, kan der forekomme en øget størrelse af såret i starten. Det er normalt og kan forventes.
 - I begyndelsen kan det være nødvendigt at skifte bandagen hyppigere, fordi en ændring i behandlingen kan resultere i en forsgelse af væske.
3. Fjern de resterende beskyttelsesfilm, og udglat produktet mod huden. Stræk ikke bandagen.
4. Mepilex Border Flex kan blive siddende i op til sy dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand eller i henhold til de kliniske reningslinjer.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farven til en mere gultig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produkets egenskaber, når blot det anvendes i ordbørsdatoen.

Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepilex Border Flex skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepilex® og Safetac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.



Περιγραφή προϊόντος

To Mepilex Border Flex είναι ένα αυτοκόλλητο απορρραφτικό επίθεμα που διατηρεί υψηλό το περιβάλλον της πληγής. Το αδιέβροχο εξωτερικό στρώμα προστέμενε πτηνή πληγή από ρύπους και βακτηρία. Το επίθεμα έχει ένα στρώμα εποφής με την πληγή Safetac® που είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αυτοκόλλητης, η οποία ελαχιστοποιεί την πόση των αδιέβροχών και την πρόκληση πρωματισμού στις πληγές κατά το παρεμπλεκόν δέρμα κατά την αριθμετη του επίθεματος.

To Mepilex Border Flex αποτελείται από:

- ένα στρώμα εποφής με την πληγή που αποτελείται από αυτοκόλλητο μαλακής σιλικόνης (Safetac®) και ένα φρέσο από μεμβράνη
- ένα εύκαμπτο απορρραφτικό επίθεμα σε τρία στρώματα: αφρό, μη υφασμένο στρώμα εξιλαστικό και στρώμα με υπερασφραγικής ίνες, το επίθεμα πληγής έντασης είναι εν μέρει διάτριπτο με τεκνολογία εύκαμπτης αποκλειστής
- μια εξωτερική μεμβράνη, η οποία είναι διαπνέουσα αλλά σιδηρόσκητη και παρέχει ένα φραγμό στο έξωτερικού μιούλωματικού παρθένους.

Συστατικά μικρού επίθεματος:

Σιλικόνη, πολυαισθητική, πολυακρυλικό, βαμβάκι, βιολάζη, πολυεστέρα και πολυαλεφίνη.

Εφεδειξις καρκίνους

To Mepilex Border Flex είναι σχεδιασμένο για ένα μεγάλο φάρμα πληγών με εκκρεμείς, όπως έλκη καρκίδων, έλκη στις κνήμες και τα πόδια, πληγές από τραύματα (π.χ. τραυματικές ρήξεις του δέρματος) και χειρουργικά τραύματα. To Mepilex Border Flex μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσημα σε δρέπανη, κεντρικούς πληγές σε συνδυασμό με γέλα. To Mepilex Border Flex μετέβαλε το σχηματισμό φλακτωνών μετεγχειρητικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσημα, ως μέρος της προφυλακτικής θεραπείας για την πρόληψη θλίψης στο δέρμα, π.χ. έλκη καρκίδων.

Προσαρδεύεις

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με γνωστή υπερευασθοσία στα εισερχόμενα υλικά/εξαρτήματα του προϊόντος.
- Να μην χρησιμοποιείται μαζί με παρόχυτες οξειδωσης, δημια υποκαλυπτώδη διαθέματα ή υπερξείδιο του υδρονόμου.
- Εάν πραγματίσετε ενδοθετή λειτουργία, π.χ. παρετό ή το γραμμά ή το παρακείμενο δέρμα γίνεται κόκκινο, ζεστό ή διογκωμένο, σημαίνετε ότι την περιγέλαμητη υφεσία για την κατάλληλη θεραπεία.
- Η χρήση επιθεμάτων στη πλάτη πρωματικής θεραπείας δεν αποκλείεται την ανάγκην και πρότον ενώς ολοκληρωμένου πρωτόκολλου για πρόληψη έλκων καρκίδων, δηλαδή επιφάνειες στηρίξης, στάθμη, διαπραγμή, ευθίδηση, φροντίδα δέρματος και κυνηγόπτωση.
- Μην επινοχηρανθρώπινετε. Σε περίπτωση επινοχηρανθρώπινης, η απόδοση του πρωτότος μπορεί να μειωθεί και να προκαλέσει δισταγματικήν μόλυνση.
- Αποστεραμένο. Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αρρώστιαμένο φραγμός έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχθεί πριν από τη χρήση. Μην επανυποστηρίξετε.

Λοιπές πληροφορίες

- Ο αφρός πολυαισθητικής που χρησιμοποιείται στο πρώτον ενδέκεταν να αλλάξει χρώμα σε ποιο κίτρινο χρώμα, όταν εκτεθεί στο πλακό φως, τον αέρα ή και σε θερμοπλαστική. Η μεταβολή του χρώματος δεν επηρεάζει τις διόπτρες του πρωτότος, εφόσον αυτό χρησιμοποιείται πριν την πληρομή λήξης του. Σε περίπτωση που ουρίστε κάποια σιδηρά ουρήβων σε σχέση με το Mepilex Border Flex, θα πρέπει να οπικανωθεί με την Mölnlycke Health Care.

To Mepilex® and Safetac® είναι σήματα κατατεθέντα της Mölnlycke Health Care AB.

**Οδηγίες χρήσης**

To Mepilex Border Flex μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη ειδικούς υπό την επιβλεψη εποικεγμάτων του κλάδου της υγείας.

1. Επιέλγετε το κατάλληλο μέτρησης/σχήμα επίθεματος. Επιλέξτε ένα σχήμα επίθεματος, κατάλληλο για την αγγεκτήσιμην ανατομική περιοχή.

Χρήση σε πληγές:

To επίθεμα πληγής πρέπει να θα επικαλυπτεί το στεγνό περιβάλλον δέρμα κατά τουλάχιστον 1 έως 2 εκατοστά προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον δέρμα από τη διαβροχή και για την ασφαλή τοποθέτηση του επίθεματος.

Προληπτική χρήση:

Βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα πληγής καλύπτει την περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος τρουματισμού/βλάβης λιτού.

2. Χρήση σε πληγές:

Καθηρίστε την πληγή σύμφωνα με την κλινική πρακτική. Στεγνώστε καλά το περιβάλλον δέρμα. 3. Αφαιρέστε την πρώτη μεμβράνη στεγνευτέρωσης και εφαρμόστε την αυτοκόλλητη στην πληγή.

4. Αφαιρέστε τις υπόλοιπες σπενδύδεσις σπειρεύθεωσης και επικολλήστε στο δέρμα στην πληγή.

Μην τεντώσετε.

To Mepilex Border Flex μπορεί να παρασείτε τοποθετημένο για έως και 7 ημέρες, ανάλογα με την κατάσταση του πρωματος και του παρακείμενου δέρματος ή συμφωνά με την ενδεικυρώνενη κλινική πρακτική.

Χρήση σε πληγές:

- To Mepilex Border Flex μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπως από ελαστική επιθέματος.

• Επειδή το Mepilex Border Flex διατηρεί υγρό το περιβάλλον της πληγής, το οποίο διευκολύνει την απορρόφηση του νεκραγμένου λιτού, μπορεί αρχικά να ουριθεί το μέτεβος της πληγής. Αυτό έναν φυσιολογικό και αναμενόμενο.

- Μια αλλαγή στη θεραπευτική σημαγή με επιθέματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αρχικά ουρήματα επειδή εδήδωματος, το οποίο μπορεί προσωρινά να αποτίνεται αυξημένη συγκρότηση λιτού.

Προληπτική χρήση:

Η περιοχή σε κινδυνό εμπορίας έλκους κατάλληλης/βλαβής λιτού πρέπει να ελέγχεται ανά τοκτά χρονική διαστηματική, σύμφωνα με την κλινική πρακτική.

Η απόρροψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.





Mepilex® Border Flex

Samoprzylepny opatrunk piaskowy z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu

Opis produktu

Mepilex Border Flex jest samoprzylepnym, chłonnym opatrunkiem, który utrzymuje wilgoć w ranie. Wodoodporna warstwa zewnętrzna chroni ranę przed zanieczyszczeniami i bakteriami. Opatrunk ten ma warstwę kontaktową Safetac®, która jest oparta na unikalnej technologii adhezyjnej. Minimalizuje ona ból oraz uraz rany, otaczając ją skórą podczas zdejmowania opatrunku.

Mepilex Border Flex składa się z:

- warstwy kontaktowej z miękkiego silikonu (Safetac) rozprowadzonej na blonie poliuretanowej;
- elastycznej, trójwarstwowej części chłonnej składającej się z: pianki poliuretanowej, warstwy wkładowej oraz warstwy superabsorbentu, zawierającej bardzo chtonne włókna profilaktykowe; wyspa opatrunkowa jest częściowo perforowana – wykonana za pomocą technologii Flex Technology;
- raccinania wyspy opatrunkowej;
- warstwy superprzepuszczalnej błony zewnętrznej, która chroni przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami.

Ksiad opatrunku: Mepilex Border Flex pomaga zredukować ryzyko wystąpienia pooperacyjnych i silikon, poliuretan, poliakryl, bawelna, wiskoza, poliester oraz poliolefina.

Wskazania do stosowania

Opatrunk Mepilex Border Flex jest przeznaczony do wielu rodzajów ran z wysiękiem, tj. odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, rany pouzarewe (np. rozdarcia skóry) i rany chirurgiczne. Opatrunk Mepilex Border Flex można również stosować na rany suchej i nerkotryzne w połączeniu z żelami.

Opatrunk Mepilex Border Flex pomaga zredukować ryzyko wystąpienia pooperacyjnych i może być stosowany jako element profilaktyki uszkodzeń skóry np. odleżyn.

Środki ostrożności

- Nie należy stosować u pacjentów ze znana nadwrażliwością na materiał/łykańki produktu.
- Nie wolno stosować opatrunku łącznie ze środkami utleniającymi, jak np.: roztwory podchlorynow lub nadilenu wodoro.
- W przypadku pojawienia się oznak infekcji, np. gorączki, zaczerwienienia i obrzęku rany lub otaczającej skóry, zwiększenie ciepłotu ciała, należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem medycznym w celu podjęcia właściwego leczenia.
- Stosowanie opatrunków jako części terapii profilaktycznej nie wyklucza potrzeby utworzenia i przestrzegania ogólnej procedury zapobiegania odleżynom, jak np.: stosowanie narzędzi podtrzymujących, ułożenie pacjenta, odżywanie, nawadnianie, pielęgnacja skóry oraz rehabilitacja pobudzająca mobilność pacjenta.
- Nie używać ponownie. W przypadku ponownego użycia, działania produktu może ulec pogorszeniu, może również wystąpić zakażenie kryzowe.
- Sterylne. Nie stosować w przypadku, gdy opakowanie (sterylna bariera) zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone. Nie sterylizować ponownie.

Instrukcja użytkowania

Mepilex Border Flex może być używany przez osoby leżące pod nadzorem pracowników służby zdrowia.

1. Dobrać odpowiednią wielkość/kształt opatrunku. W razie potrzeby należy wybrać kształt opatrunku dopasowany do konkretnego miejsca anatomicznego.

Do użycia na ranach:

Opatrunk powinien zachodzić na suchą otaczającą skórę na co najmniej 1-2 cm. Zapewnia to jego prawidłowe umocowanie i ochronę skóry przed maceracją.

W przypadku prewencji:

Należy dobrze odpowiednią wielkość opatrunku tak, aby pokryć powierzchnię skóry narażoną na powstawanie odleżeń/ uszkodzenia tkanki.

2. Do użycia na ranach:

Należy zająć się zgodnie z praktyką kliniczną. Starannie osuszyć otaczającą skórę. Usunąć śródskórową folię zabezpieczającą i zaplikować opatrunk strona przyklepną do rany. 3. Do użycia na ranach:

Opratunek Mepilex Border Flex można pozostawić na miejscu do 7 dni, zależnie od stanu rany i otaczającej skóry lub zgodnie z praktyką kliniczną.

Do użycia na ranach:

- Opatrunk Mepilex Border Flex może być stosowany w połączeniu z kompresjoteriąpią.
- Poniżej opatrunk Mepilex Border Flex utrzymuje wilgotne środowisko niezbędne do gojenia się rany, co ułatwia jej oczyszczanie, poczynającowe moze dojść do zwiększenia powierzchni rany. Jest to normalne zjawisko, którego należy się spodziewać.
- Usunąć pozostałą folię i wygaścić brzegi opatrunku na skórze. Nie rozlegać.
- Zmiana sposobu opatrunkowania rany może spowodować początkowo wzrost wysięku w ranie, a przez to może wymagać przez pewien czas częstszej zmiany opatrunków.

W przypadku prewencji:

Obraną skórę na wystąpienie odleżeń/ uszkodzenia tkanki powinien być regularnie monitorowany zgodnie ze standardową praktyką kliniczną. Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi procedurami ochrony środowiska.

Informacje dodatkowe

Pianka poliuretanowa zastosowana w opatrunku może zmienić zabarwienie na bardziej żółte, gdy zostanie wystawiona na działanie światła, powietrza i/lub ciepła. Zmiana zabarwienia nie ma wpływu na właściwości produktu, jeżeli jest on używany przed upływem daty ważności. Wszelkie niepożądane zdarzenia związane z Mepilex Border Flex należy zgłaszać firmie Mölnlycke Health Care.

Mepilex® i Safetac® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Samolepicí měkké silikonové krytí



Popis výrobku

Mepilex Border Flex je samolepicí absorpční krytí, které udržuje vlhké prostředí rány. Voděodolná vrchní vrstva chrání ránu před nečistotami a bakteriemi. Krytí má speciální kontaktní vrstvu na rány Safetac® s unikátní adhezivní technologií. Minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně a jejím okolí při odstraňování krytí.

Mepilex Border Flex se skládá z:

- Kontaktní vrstvy na ránu z měkkého adhezivního silikonu (Safetac) na fólii.
- Pružného savého polštářku sestávajícího ze tří vrstev: z pěny, z vrstvy z netkané textilie a z vrstvy se superabsorpčními vlákny; polštárek je částečně perforovaný za použití technologie Flex.
- Vnější fólie, která je prodyšná a voděodolná, čímž vytváří bariéru proti vnější kontaminaci.

Složení krytí:

silikon, polyuretan, polyakrylát, bavlna, viskóza, polyester a polyolefin.

Indikace použití

Mepilex Border Flex je určen pro širokou škálu exsudujících ran, jako jsou dekubity, vředy na nohou a běrcové vředy, traumatické rány (např. praskliny v kůži) a chirurgické rány. V kombinaci s gely lze Mepilex Border Flex také použít na suché/nekrotizující rány.

Krytí Mepilex Border Flex redukuje tvorbu pooperačních puchýřů a může být použito jako součást profylaktické terapie k prevenci poškození kůže, jako např. dekubitu.

Upozornění

- Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na materiály/složky výrobku.
- Nepoužívejte společně s oxidačními činiidy jako roztoky chlornanu nebo peroxidu vodíku.
- Pokud zjistíte známky infekce, např. horečka nebo rána a okolní kůže jsou zarudlé, oteklé nebo je v místě rány zvýšená teplota, poraďte se s lékařem o vhodné léčbu.
- Použití krytí jako součásti profylaktické terapie nevyulučuje potřebu nadále rozvíjet a dodržovat komplexní protokol prevence dekubitů, tj. podpůrné plochy, polohování, výživa, hydratace, péče o pokožku a mobilita.
- Nepoužívejte opakováně. Při opětovném použití se charakteristiky výrobku mohou zhoršit a může se vyskytnout křížová kontaminace.
- Sterilní. Nepoužívejte, pokud je sterilní bariéra před použitím poškozena nebo otevřena. Znovu nesterilizujte.

Pokyny k použití

Krytí Mepilex Border Flex mohou používat laici pod dohledem kvalifikovaného zdravotníka.

1. Vyberte správnou velikost a tvar krytí. Podle potřeby zvolte tvar krytí odpovídající anatomii místa použití/predilekčnímu místu.

Při použití na rány:

Krytí by mělo přesahovat na suchou kůži kolem rány alespoň o 1–2 cm, aby byla okolní kůže chráněna před macerací a aby bylo dosaženo spolehlivé fixace krytí.

Při použití v rámci prevence:

Ujistěte se, že polštárek zakrývá oblast ohroženou dekubity/poškozením tkáně.

2. Při použití na rány:

Ránu vyčistěte podle zavedené klinické praxe. Okolí rány důkladně vysušte.

3. Odstraňte z krytí první snímatelnou fólii a přiložte je přilnavou stranou na ránu.

4. Odstraňte z krytí zbývající snímatelné papíry a okraje krytí na kůži vyhladte. Nenatahuje.

Mepilex Border Flex lze ponechat na místě až 7 dnů v závislosti na stavu rány a okolní kůže, případně podle zavedené klinické praxe.

Při použití na rány:

- Mepilex Border Flex může být použit pod kompresními obvazy.

• Jelikož Mepilex Border Flex udržuje prostředí rány vlhké a podporuje tak debridement, velikost rány se zpočátku může zvětšit. Je to normální jev a je třeba s ním počítat.

• Změna krytí může na začátku způsobit zvýšenou produkci exsudátu, což může dočasně vyžadovat kratší intervaly výměny.

Při použití v rámci prevence:

Oblast ohroženou dekubity/poškozením tkáně je nutné pravidelně kontrolovat podle zavedené klinické praxe.

Likvidace by měla probíhat podle platných předpisů na ochranu životního prostředí.

Další informace

Polyuretanová pěna použitá ve výrobku může působením světla, vzduchu nebo tepla změnit barvu na žlutější. Změna barvy nemá žádný vliv na změnu vlastností výrobku, pokud bude použit do data expirace.

Pokud dojde k závažné události v souvislosti s krytím Mepilex Border Flex, je nutno ji oznámit společnosti Mölnlycke Health Care.

Mepilex® a Safetac® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex



Használati utasítás

Öntapadó, lágy szilikonbevonatú habkötöző

Termékleírás

A Mepilex Border Flex öntapadó nedvészű kötszer nedves környezetet biztosít a seb számára. Vizában Különös bőrre vedi a sebet a szennyeződéstől és a baktériumoktól. A kötszer egyedülálló SetaTac® öntapadó technológiás sebiedő rétegeit rendelkezik, amely a kötszer eltavolításakor minimálisra csökkenti a beteg fájdalmát, valamint a sebet és a környező bőrt érő traumát.

A Mepilex Border Flex a Kovetkezőből áll:

- Lágy szilikonragasztó (Safetac®) és hordozófilm alkotta sebiedő réteg
- Szuperabszorbens szálakból álló réteg: a sebiedő párna részben perforált a Flex vágási technológiával
- Légátereszű, de vízhatlan kultűs filmréteg, amely védi a sebet a külső szennyeződéstől
- A kötszer anyaiösszetétele:

szilikon, poliuretan, poliakrilát, pamut, viszkóz, poliészter és poliolefín.

Terápiás javallatok

A Mepilex Border Flex számos különfél típusú valadékotűrő seb, például nyomás következtében kialakult fekelyek, a láb és a lábfej fekelyei, traumás sebek (pl. bőrsérülések) és sebeszeti hegék kezelésére szolgál. A Mepilex Border Flex gelét kombinálva száraz/nekrotikus sebekben is alkalmazható.

A Mepilex Border Flex enyhíti a műtét utáni hővagassodást, és profilaktikus terápia részeként is alkalmazható a bőrsérülések, pl. nyomás következtében kialakult fekelyek megelőzésére elsegítésére.

Ötvintézetkedések

- Nem alkalmazható a beteg ismert túlerzékenysége esetén a termék alapanyagaival/visszereivel szemben.
- A kötszer nem használható oxidálószerrel, például hipokloritoldattal vagy hidrogén-peroxiddel együtt.
- Fertőzés jelei, például láz, illetve a seb vagy a környező bőr vörösesé, meleggé vagy duzzadtávalába esetén forduljon egészségügyi szakemberhez a megfelelő kezelés érdekében.
- Kötszerrel profilaktikus terápia részeként történő alkalmazása nem teszi szükségtelené a nyomású fejély megelőzésére szolgáló átfogó stratégiáig kidolgozását és alkalmazását, vagyis a felületek alátmasszását, a pozíció állást, táplálást, hidratást, bőrápolást és mobilizálást.
- Ne használja fel többféléről ugyanazt a terméket! Ismételt felhasználás esetén a termék minősége romolhat, és kereszterítőzés léphet fel.
- Steril. Ne használja fel a terméket, ha a steril gát sérült, vagy a felhasználást megelőzően kinyilt. Tilos újrafestel!



A Mepilex Border Flex laikus személyek általi, egészségügyi szakemberek felügyelete alatti használatra szolgál.

1. Válassza ki a megfelelő kötszerméretet és -alakot. Szükség esetén a konkréttanatómiai helyhez optimalizált alakot válasszon.

Seben történő alkalmazás:

A sebiedő párnának a környező bőr macerációjának megakadályozása és a kötszer stabil rögzítése érdekében legalább 1-2 cm-reire a környező szaraz bőrre kell nyúlnia.

Megelőzésre történő alkalmazás:

A sebiedő párnának le kell fednie azt a területet, amelyet feltekéves vagy szövetsérülés veszélye fenyeget.

2. Seben történő alkalmazás:

Tisztításra meg a sebet a klinikai gyakorlatban megfelelően. A seb környékét gondosan szárítsa meg. Seben történő alkalmazás:

3. Távoítsa el az első védőfoliát, és öntapadós oldalával helyezze a sebre a kötszert.

4. Távoítsa el a további védőlapokat, és simítsa rá a kötszer szegélyét a bőrre. Ne nyújtsa meg a kötszert.

A Mepilex Border Flex akár 7 napig is a helyén hagyható a seb és a környező bőrfelület állapotától, valamint a klinikai gyakorlatról függően.

Seben történő alkalmazás:

- A Mepilex Border Flex kompressziós kötés alatt is alkalmazható.
- Mivel a Mepilex Border Flex a seb kitisztulását elősegítő nedves környezetet tart fenn, kezdetben előfordulhat a seb mértéken növekedése. Ez normális és váratlan jelenség.
- A kötzési eljárás megváltoztatása kezdetben a sebátladék mennyiségenek növekedésével járhat, ami általmenetileg gyakoribb kötéscesszert tehet szükségesse.

Megelőzésre történő alkalmazás:

A feltekéves vagy szövetsérülés veszélye általi fenyegetett területet a klinikai gyakorlatnak megfelelően rendszeres időközönként meg kell vizsgálni. A termék hulladékkezelését a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell végezni.

További információk

A termékhöz használható poliuretan hab fűny, levegő, illetve hő hatására megsárgulhat. Ez a színátverőzés a lejáratú dátum előtt történő felhasználás esetén nem befolyásolja a termék tulajdonosságait.

A Mepilex Border Flex kötszerrrel kapcsolatos minden komoly incident jelenteni kell a Mölnlycke Health Care fel.

A Mepilex® és a Safetac® a Mölnlycke Health Care AB bejegyzett védjegyei.

Tilos újrafestel!

Mepilex® Border Flex

Selvheftende, myk skumbandasje med silikon



Produktbeskrivelse

Mepilex Border Flex er en selvheftende, absorberende bandasje som opprettholder et fuktig sårmiljø. Den vanntette toppfilmen beskytter såret mot smuss og bakterier. Bandasjen har Safetac® sårankontaktlag, som er en unik hefteteknologi. Det minimerer smerte hos pasienten og skade på såret og den omkringliggende huden ved fjerning av bandasje.

Mepilex Border Flex består av:

- et sårankontaktlag av myk silikonheft [Safetac]
- en fleksibel, absorberende pute i tre lag: skum, et spredningslag i non-woven og et lag med superabsorberende fibre, sårputen er delvis perforert med Flex-teknologi
- en utvendig film som er pustende, men vanntett, og danner en barriere mot yttere kontaminering

Innhold i bandasjematerialet:

Silikon, polyuretan, polyakrylat, bomull, viskose, polyester og polyolefin.

Bruksområder

Mepilex Border Flex eigner seg for et bredt spekter væskende sår, som trykksår, legg- og fotås, traumatiske sår [f. eks. hudrifter] og operasjonssår. Mepilex Border Flex kan også brukes på tørre/nekrotiske sår i kombinasjon med gel.

Mepilex Border Flex reduserer postoperative blemmer, og kan benyttes som en del av profylaktisk behandling for å forebygge hudskader, f.eks. trykksår.

Forholdsregler

- Skal ikke brukes på pasienter med kjent allergi mot materialene/bestanddelene i produktet.
- Må ikke brukes sammen med oksiderende stoffer som hydrogenperoksid.
- Rådfør deg med helsepersonell før passende behandling hvis du ser tegn på infeksjon, f.eks. feber eller hvis såret eller den omkringliggende huden blir rød, varm eller opphøvet.
- Bruk av bandasjer i profylaktisk behandling eliminerer ikke behovet for å fortsette å utvikle og følge en omfattende protokoll for forebygging av trykksår, som kan omfatte trykkavlastende hjelpeidoler, venderegime, ernæring, væsketilførsel, hudbehandling og mobilitet.
- Skal ikke gjenbrukes. Dersom produktet brukes om igjen, kan bandasjens egenskaper forringes, og det kan forekomme krysskontaminering.
- Steril. Må ikke brukes hvis den sterile barrieren er skadet eller åpnet før bruk. Skal ikke resteriliseres.

Bruksanvisning

Mepilex Border Flex kan brukes av lekpersoner under tilsyn av kvalifisert helsepersonell.

1. Velg en egnet bandasjestørrelse/-fasong. Velg om mulig en bandasjefasong som er tilpasset det spesifikke anatomiske området.

For bruk på sår:

Sårputen skal overlate den tørre huden rundt såret med minst 1-2 cm for å beskytte omkringliggende hud mot maserasjon og for at bandasjen skal få tilstrekkelig feste.

Ved bruk til forebygging:

Forsikre deg om at sårputen dekker området som er utsatt for trykksår/vevsskade.

2. For bruk på sår:

Rengjør såret i henhold til klinisk praksis. Tørk omkringliggende hud grundig.

3. Fjern den første releasesfilmen, og legg den heftende siden mot såret.

4. Fjern resten av releasefilmene og glatt ut kanten mot huden. Ikke strekk bandasjen.

Mepilex Border Flex kan sitte på i opptil syv dager, avhengig av sårets tilstand og den omkringliggende huden, eller i henhold til klinisk praksis.

For bruk på sår:

- Mepilex Border Flex kan brukes under kompresjonsbandasjer.
- Da Mepilex Border opprettholder et fuktig sårmiljø, som støtter debridering, kan det i første omgang forekomme en økning i sårstørrelse. Dette er normalt, og må forventes.
- En endring i behandlingsregime kan medføre at såret i første omgang avgir mer sårvæske, slik at det blir nødvendig å skifte bandasje hyppigere.

Ved bruk til forebygging:

Området som er utsatt for trykksår/vevsskade skal inspiseres regelmessig i henhold til klinisk praksis.

Avfall håndteres i samsvar med lokale miljøprosedyrer.

Annen informasjon

Polyuretanskummet som er brukt i produktet, kan skifte farge til å bli mer gulaktig når det eksponeres for lys, luft og/eller varme. Fargeendringen har ingen innvirkning på produktgenskapene ved bruk før utløpsdatoen.

Hvis det forekommer en alvorlig hendelse i forbindelse med Mepilex Border Flex, skal denne rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepilex® og Safetac® er registrerte varemerker for Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Mehká samolepilna obloga z silikonské pene

Opis izdelka

Mepilex Border Flex je samolepilna vpojna obloga, ki ohranja območje rane vlažno. Ima vodoodporo zunanjega plasti, ki ščiti rano pred umazanjem in bakterijami. Obloga ima na stični strani z rano plasti Saefac®, ki je edinstvena lepljiva tehnologija. Ta pri odstranitvi obveje zmanjšuje bolečino, ki jo občutí bolnik, in dodatne poškodbe ran.

Obloga Mepilex Border Flex je sestavljena iz:

- Plasti na stični strani z rano, ki je sestavljena iz mehkega silikonskega lepila (Saefac) in filma
- prožne vpojne komprese iz treh slojev: pene, netkanega sloja za enakomerno porazdelitev tekočin in plasti z zelo vpojnimi vlakni; kompresa je delno perforirana s tehnologijo rezanja Flex
- zunanjega filma, ki je prepušnji za zrak, ne pa tudi za vodo, in preprečuje stik z zunanjimi kontaminantmi

Sestava materiala oblage:

silikon, poliuretan, poliakrilat, bombaž, viskoza, poliester in poliolefín.

Indikacie za uporabo

Obloga Mepilex Border Flex je namenjena oskrbi številnih vrst vlažnih ran, na primer razjed zaradi pritsika (prelezjanja), razjed na nogah in stopalih, travmatiskih ran (npr. raztrganin kože) in kirurških ran. Obloga Mepilex Border Flex lahko uporabljamo v kombinaciji z gelii na suhih/nekrotičnih ranah.

Obloga Mepilex Border Flex zmanjšujejo nastajanje pooperacijskih mehurčkov, lahko pa jih uporabljamo tudi kot prizomoček za preprečevanje poškodb kože pri profilaktičnem zdravljenju, npr. za preprečevanje razjed zaradi pritska.

Predvidnostni ukrepi

- Oblage ni dovoljeno uporabljati pri oskrbovancih z znano preobčutljivostjo na oblogo ali njene sestavine.
- Oblage ne uporabljajte z oksidirajočimi snovmi, kot so hipokloritne raztopine ali vodikov peroksid.
- Če opazite znake vnetja, npr. pri površini telesni temperaturi ali če rana ozroma okolica kože postane rdeča, topla ali otekla, se obrnite na zdravstveno osebje, ki bo zagotovilo ustrezno zdravljenje.
- Uporaba oblog za rane v okviru profilaktične terapije ne pomeni, da ni treba vseeno razvijati in upoštevati celovitega protokola za preprečevanje razjed zaradi pritsika, torje skrb za opore površine, ustrezeno nameščanje bolnika, prehrano, hidracijo, ustrezeno okrbo kože in mobilnost.
- Ne uporabljajte znova. Ponovna uporaba izdelka lahko privede do poslabšanja lastnosti izdelka in navzkržnega okvira.
- Sterilno. Ne uporabljajte izdelka s poškodovanim ali odprtim sterilnim zaščitnim slojem. Ponovna sterilizacija ni dovoljena.

Navodila za uporabo

Obloga Mepilex Border Flex lahko pod nadzorom zdravstvenega osebja uporabljajo tudi nestrojnivaki.

1. Izberite oblogo pri primerne velikosti/oblike. Kadar je mogoče, izberite oblogo, ki je po obliki najprimernejša za posamezno anatomsko mesto.

Za oskrbo ran:

- Zaradi zaščite okolice kože pred maceracijo in varne pritridle obloge mora blazinica za rano prekrivati še najmanj 1-2 cm sute kože okoli rane.

Za preventivno uporabo:

- Prepričajte se, da obloga prekrije območje, na katerem je prisotno tveganje za nastanek razjedov.

Za oskrbo ran:

- Očistite rano skladno s klinično praksjo. Temeljito osušite kožo okoli rane.

3. Odstranite prvi zaščitni film in namestite oblogo tako, da je lepljiva stran obrnjena proti rani.

4. Odstranite preostale zaščitne trakove in robove pogladite na kožo. Ne raztegujte.

Obloga Mepilex Border Flex lahko pustitimo na rani do 7 dni, odvisno od stanja rane in kože okoli nje oziroma v skladu s kliničnimi smernicami.

Za oskrbo ran:

- Obloga Mepilex Border Flex je mogoče uporabljati pod kompresijskim povojem.
- Ker obloga Mepilex Border Flex ohranja vlažno okolje rane, s čimer podpira odstranjevanje odmrilne tkiva, lahko ob začetku uporabe pride do povečanja velikosti rane. To je povsem normalen in pričakovani pojav.

• Sprememba načina povojanja rane lahko privede do začetnega povečanja količine izločka, zaradi česar bo morda treba oblogo nekaj časa pogosteje menjati.

Za preventivno uporabo:

- Območje, na katerem lahko nastanejo razjede zaradi pritisaka/poškodbe tkiva, je treba redno prejedovati v skladu s kliničnimi smernicami. Izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi smernicami o varovanju okolja.

Druge informacije

Poliuretanska pena, uporabljena v izdelku, lahko ob stiku s svetlobo, zrakom in/ali toplo toploto ponumeni. Sprememba barve ne vpliva na lastnosti izdelka, ko ga uporabljate pred izkonom roka uporabnosti.

- Če pride v povezavi z uporabo oblog Mepilex Border Flex do kakršnega koli resnega incidenta, je treba o tem obvestiti družbo Mölnlycke Health Care.

Mepilex® in Saefac® sta registrirani blagovni znamki družbe Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Самозалепваща превръзка от мека силиконова пяна



Описание на продукта

Mepilex Border Flex е самозалепваща се абсорбираща превръзка, която поддържа влажна среда за застраване на раната. Водоустойчивият външен слой предпазва раната от замърсяване и бактерии. Превръзката има слой Safetac®, който е в контакт с раната и е с уникална технология за залепване. Тя минимизира болката за пациента и травмирането на раните и околната кожа при сваляне на превръзката.

Mepilex Border Flex се състои от:

- контактен слой за раната, състоящ се от мека силиконова лепенка [Safetac] и филм;
- гъвкава абсорбираща подложка от три слоя: пяна, нетъкан покривен слой и слой от супер абсорбиращи влакна; подложката за рани е частично перфорирана с Flex технология за пропрязване;
- външен филм, който е дишащ, но водоустойчив, осигурявайки бариера за външните замърсявители

Съдържание на материала на превръзката:

силикон, полиуретан, полиакрилат, памук, вискоза, полиестер и полиолефин.

Предназначение

Mepilex Border Flex е предназначена за голям спектър от ексудиращи рани, като декубитални язви, язви на крака и стъпалото, както и травматични рани [например кожни разкъсвания] и хирургични рани. Mepilex Border Flex може също така да се прилага и върху сухи/некротични рани в комбинация с гелове.

Mepilex Border Flex намалява постоперативните мехури и може също да се използва като част от профилактичната терапия за предотвратяване на увреждане на кожата – например декубитални язви.

Предпазни мерки

- Не използвайте при пациенти с доказана свръхчувствителност към използваните материали/ компоненти на продукта.
- Не използвайте заедно с окислителни агенти, като хипохлоритни разтвори или водороден прекис.
- Ако видите следи от инфекция, например ако раната или околната кожа стане червена, топла или подута, се консултирайте с медицински специалист за подходящо лечение.
- Използването на лепенки като част от профилактиката не изключва необходимостта да продължи развитието и спазването на един обстойен протокол за предотвратяване на декубитални язви, например поддръшка на повърхностите, позициониране, хранене, хидратация, грижа за кожата и подвижност.
- Да не се използва повторно. При повторна употреба действието на продукта може да се влоши, може да се получи кръстосана контаминация.
- Стерилно. Да не се използва, ако стерилината преграда е повредена или отворена преди употреба. Да не се стерилизира повторно.

Инструкция за употреба

Mepilex Border Flex може да се използва от неспециалисти под наблюдението на здравни специалисти.

1. Изберете подходящите размер/форма на превръзката. Когато е приложимо, изберете форма на превръзката, която е оптимизирана за конкретното анатомично място.

За използване при рани:

Подложката за рани трябва да застъпва сухата кожа около раната с поне 1 – 2 см, за да предпази околната кожа от мацерация и за да закрепи лепенката стабилно.

Ако се използва за превенция:

Уверете се, че подложката за рани покрива областта с риск от декубитална рана/увреждане на тъката.

2. За използване при рани:

Почистете раната в съответствие с клиничната практика. Старателно подсушете кожата около раната.

3. Отстранете първо предпазния филм и поставете със залепващата страна към раната.

4. Отстранете оставащите предпазни ленти и сложете гладко продукта върху кожата. Не разтягайте.

Mepilex Border Flex може да престои върху раната до 7 дни в зависимост от състоянието на раната и околната кожа или според клиничната практика.

За използване при рани:

- Mepilex Border Flex може да се прилага под компресираща превръзка.
- Тъй като Mepilex Border Flex поддържа влажна среда за раната, която подпомага изчистването й, може да има първоначално увеличаване на размера на раната. Това е нормално и може да се очаква.
- Промяна в терапевтичния режим за превръзване може да предизвика първоначално увеличение на ексудата, което може да наложи временно по-честа подмяна.

Ако се използва за превенция:

Областта с риск от декубитална язва/увреждане на тъката трябва да се преглежда на редовни интервали според клиничната практика.

Изхвърлянето трябва да се осъществява според местните процедури за опазване на околната среда.

Друга информация

Полиуретановата пяна, използвана в продукта, може да промени цвета си към по-жълт, когато е изложенa на светлина, въздух и/или топлина. Промяната на цвета не влияе на свойствата на продукта, когато той се използва в срока на годност.

При възникване на сериозен инцидент, свързан с употребата на Mepilex Border Flex, същият трябва да бъде докладван на Mölnlycke Health Care.

Mepilex® и Safetac® са регистрирани търговски марки на Mölnlycke Health Care AB.

**Instrucțiuni de utilizare**

Mepilex Border Flex poate fi utilizat de către persoanele nespecializate în domeniul sanitar sub supravegherea unui cădrul sănătar.

1. Alegeți o mărime/formă de pansement corespunzătoare. Dacă este cazul, alegeți o formă de pansement optimizată pentru zona anatomică respectivă.

Pentru utilizarea pe plagă:

Tamponul pentru plagă trebuie să se suprapună pe tegumentul periferional uscat pe o portiune de minimum 1 – 2 cm pentru a proteja tegumentul periferional de macerare și pentru a fixa bine pansementul.

Pentru utilizarea preventivă:

Asigurați-vă că tamponul pentru plagă acoperă zona cu risc de escară de decubit/lezune tisulară.

2. Pentru utilizarea pe plagă:

Curățați plagă conform practiciei clinice. Usați bine tegumentul periferional.

3. Îndepărtați prima peliculă protectoră și aplicați partea adezivă pe plagă.

4. Îndepărtați căptușeala protectoră râmasă și netezătingă marginea pe piele. Nu întindeți.

Mepilex Border Flex poate fi lăsat timp de maximum 7 zile, în funcție de starea plăgii și a tegumentului periferional sau în conformitate cu indicațiile practicii clinice.

Pentru utilizarea pe placă:

- Mepilex Border Flex poate fi utilizat sub bandaje de compresie.

• Deoarece Mepilex Border Flex menține un mediu umed în regiunea plăgii, care sustine debridarea, este posibil ca dimensiunea plăgii să crească initial. Acest fapt este normal și de așteptat.

- Modificarea schimbului de utilizare a pansementului poate duce la creșterea inițială a nivelului exudatiilor, ceea ce poate impune temporar creșterea frecvenței schimburiilor de pansement.

Pentru utilizarea preventivă:
Se recomandă ca zona cu risc de escară de decubit/lezune tisulară să fie verificată la intervale regulate, în concordanță cu practica clinică.

Eliminarea trebuie efectuată conform procedurilor locale de protecție a mediului.

Precauții
Instrucțiuni de utilizare

Mepilex Border Flex este conceput pentru o serie amplă de plăgi exudative, cum ar fi escarile de decubit, ulcere/răjitele piciorului și ale lăptii, leziunile traumaticice (precum rupturile de tegument) și plăgile chirurgicale. Mepilex Border Flex poate fi, de asemenea, utilizat pe plăgi uscate/necrotoice, în asociere cu geluri. Mepilex Border Flex reduce veziculizarea postoperatorie și poate fi utilizat ca parte a terapiei profilactice de prevenire a afectării pielii, cum ar fi escarile de decubit.

- A nu se utilizează la pacienții cu sensibilitate cunoscută la materialele/componentele produsului.
- A nu se folosi în asociere cu agenti oxidanți, precum soluțiile de hipochlorit sau apa oxigenată.
- Dacă observați semne de infecție, adică rana sau tegumentul periferional se înrăusește, se înălțează sau este umflată, adresați-vă imediat unui cădrul medical pentru a primi tratamentul adecvat.
- Utilizarea pansementelor în cadrul unei terapii profilactice nu înțără nevoie de a continua dezvoltarea și respectarea unui protocol cuprinzător de prevenire a escarelor de decubit, adică suprafete de sprijin, pozitionare, nutriție, hidratare, îngrijirea pielii și mobilitate.
- A nu se reutilizează. În caz de reutilizare, performanțele produsului se pot reduce și este posibilă contaminarea încruciață.
- Steril. A nu se folosi dacă bariera sterilă a fost deteriorată sau deschisă înainte de utilizare. A nu se resteriliza.

Alte informații

Spuma poliuretanică utilizată în produs poate modifica culoarea, adăugând un plus de culoare galbenă, atunci când este expusă la lumina, aer și/ sau căldură. Modificarea culorii nu influențează proprietățile produsului atunci când este folosit înainte de data expirării.

Dacă s-a produs un incident grav legat de Mepilex Border Flex, raportați acest lucru către Mölnlycke Health Care.

Mepilex® și Safetac® sunt mărci comerciale înregistrate ale Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Samolepiace krytie z mäkkého penového silikónu



Popis produktu

Mepilex Border Flex je samolepiace absorpčné krytie, ktoré udržiava vlhké prostredie rany. Vodotesná vonkajšia vrstva chráni ranu pred nečistotami a baktériami. Krytie má kontaktnú vrstvu na rany Safetac®, ktorá je jedinečnou adhezívou technológiou. Minimalizuje bolesť pacienta a poškodenie rán a okolitej pokožky pri odstránení obvázu.

Mepilex Border Flex sa skladá z:

- kontaktnej vrstvy na rany z mäkkého silikónového adhezívneho materiálu (Safetac) a nosiča z fólie;
- ohybnnej trojvrstvovej absorpčnej vložky: pena, netkaná krycia vrstva a superabsorpčná vrstva z vláken; tampón krytia je častočne perforovaný technológiou Flex;
- vonkajšej fólie, ktorá je priedušná, ale vodotesná, čím vytvára bariéru pre vonkajšie znečisťujúce látky.

Obsah obvázového materiálu:

silíkón, polyuretán, polyakrylát, bavlna, viskóza, polyester a polyolefín.

Indikácie pre použitie

Krytie Mepilex Border Flex je určené pre široký rozsah exsudujúcich rán, akými sú dekubity, vredy nôh a chodidiel, traumatické rany (ako napr. kožné odreniny) a pooperačné rany. Mepilex Border Flex možno v kombinácii s gélmi použiť aj na suché/nekrotické rany.

Mepilex Border Flex obmedzuje tvorbu pooperačných pluzgierov a možno ho tiež použiť ako súčasť profilaktickej terapie na prevenciu poškodenia kože, napr. dekubitov.

Preventívne opatrenia

- Nepoužívajte u pacientov so znáomou precitlivenosťou na materiály/zložky produktu.
- Nepoužívajte spolu s oxidujúcimi látkami, ako sú roztoky chlóranov alebo peroxidu vodíka.
- Ak spozorujete symptómy infekcie, ako je napr. horúčka alebo že rana alebo okolité pokožka sčervená, je teplá alebo opuchnutá, poradte sa s profesionálnym zdravotníckym pracovníkom.
- Hoci krytie možno použiť ako súčasť profilaktickej terapie, neznamená to, že už nie je potrebné vyvierať a dodržiavať komplexný protokol prevencie dekubitov, t. j. podporné plochy, polohovanie, výživa, hydratácia, ošetrovanie pokožky a mobilita.
- Nepoužívajte opakovane. Pri opäťovnom použití účinnosť produktu klesá a môže dôjsť ku krízovej kontaminácii.
- Sterilné. Nepoužívajte, ak je sterilná bariéra pred použitím poškodená alebo otvorená. Opakovane nesterilizujte.

Návod na použitie

Mepilex Border Flex môžu používať laici pod dohľadom profesionálnych zdravotníckych pracovníkov.

- Zvolte vhodnú veľkosť/tvar krytia. Ak je to relevantné, zvolte tvar obvázu optimalizovaný pre konkrétné anatomické miesto.

Použitie na ranách:

Tampón krytia má presahovať suchú okolitú pokožku najmenej o 1 – 2 cm, aby chránil okolitú pokožku pred macerovaním a obváz dobre fixoval k rane.

Použitie pri prevencii:

Skontrolujte, či tampón krytia pokrýva miesto, ktoré je ohrozené tvorbou dekubitu/poškodením tkaniva.

- Použitie na ranách:

Ranu očistite bežným klinickým postupom. Dôkladne vysušte okolitú pokožku.

- Odstráňte prvú ochrannú fóliu z krytia a aplikujte ho lepivou stranou na ranu.

- Odstráňte zvyšné ochranné výstelky a vyrovnejte okraj na pokožke. Nenaťahujte.

Krytie Mepilex Border Flex možno ponechať na mieste do 7 dní, v závislosti od stavu rany a okolitej pokožky, alebo ako je indikované klinickou praxou.

Použitie na ranách:

- Mepilex Border Flex možno použiť pod tlakovým obvázom.
- Pretože krytie Mepilex Border Flex udržiava okolie rany vlhké, čím podporuje odstránenie neživého tkaniva z rany, rana sa na začiatku môže zväčšiť. Je to normálne a očakávané.
- Pri zmene režimu výmeny krytia sa môže prechodne zvýšiť výtok z rany, čo môže vyžadovať dočasné zvýšenie frekvencie výmeny krytia.

Použitie pri prevencii:

Miesto ohrozené dekubitom/poškodením tkaniva by sa malo v súlade s klinickou praxou kontrolovať v pravidelných intervaloch.

Pri likvidácii postupujte podľa miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Iné informácie

Polyuretánová pena použitá v produkte môže po vystavení na svetlo, vzduch a/alebo teplo zmeniť farbu na žltiu. Zmena farby nemá žiadny vplyv na vlastnosti produktu, ak sa použije pred dátumom expirácie.

Ak dôjde k výskytu závažného incidentu v súvislosti s obvázom Mepilex Border Flex, nahláste to spoločnosti Mölnlycke Health Care.

Mepilex® a Safetac® sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Mölnlycke Health Care AB.



Mepilex® Border Flex

Kendiliğinden yapılan yumuşak silikon köpük pansuman



Ürün açıklaması

Mepilex Border Flex, yarıyı nemli tutan kendinden yapışkan, emici bir pansumandır. Su geçirmez dış katman yarıyı kire ve bakterilere karşı korur. Pansuman kendine özgü bir yapıştırıcı teknolojisi olan bir Safetac® yara temas tabakasına sahiptir. Hastanın ağırsını ve yaralarda travmayı ve pansumanı çıkarırken etrafındaki bölgeyi en aza indirir.

Mepilex Border Flex sunularından oluşur:

- yumuşak bir silikon yapıştırıcıdan (Safetac) ve bir film taşıyıcıdan oluşan yarıyla temas eden bir katman
- üç katmanlı esnek, emici bir ped: bir köpük, örtülü olmayan bir yayılma katmanı ve süper emici elyaf içeren bir katman; yara pedi, Flex cut teknolojisiyle kısmen perfore edilmiştir
- dış hava kirliliğine karşı koruma sağlayan, nefes alan ancak su geçirmez bir dış film

Pansuman materyalinin içeriği:

Silikon, poliüretan, poliakrilat, pamuk, viskoz, polyester ve poliolefin.

Kullanım endikasyonları

Mepilex Border Flex; basınç ülserleri, bacak ve ayak ülserleri ve travmatik yaralar (örn, cilt yırtıkları) ve cerrahi yaralar gibi çok çeşitli eksüdaysonlu yaralar için tasarlanmıştır. Mepilex Border Flex, kuru/nekrotik yaralar için jellerle birlikte de kullanılabilir.

Mepilex Border Flex, postoperatif blister oluşumunu azaltır ve basınç ülseri gibi ciltte görülen hasarların önlenmesini amaçlayan profilaktik tedavinin bir parçası olarak da kullanılabilir.

Önlemler

- Ürünün içeri giren materyallerine/bileşenlerine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanmayın.
- Hipoklorit solüsyonlar veya hidrojen peroksit gibi oksidizan ajanlarla birlikte kullanmayın.
- Enfeksiyon belirtileri görüyorsanız, örn. ateş ya da yara ya da çevreleyen cilt kızarır, ısınır ya da şiserse, uygun tedavi için bir sağlık uzmanına danışın.
- Pansumanların profilaktik bir tedavinin bir parçası olarak kullanılması, kapsamlı bir ülser önleme protokolü geliştirmeye ve izlemeye devam etme ihtiyacını engellemez, yani yüzeyleleri, konumlandırmayı, beslenmeyi, hidrasyonu, cilt bakımını ve hareketliliği destekler.
- Tekrar kullanmayın. Ürün tekrar kullanılırsa, performansı bozulabilir ve çapraz kontaminasyon görülebilir.
- Sterildir. Steril koruyucu kullanım öncesinde hasarlı veya açılmışsa kullanmayın. Tekrar sterilize etmeyiniz.

Kullanım talimatları

Mepilex Border Flex, sağlık hizmeti personellerinin gözetiminde vasıfsız kişiler tarafından kullanılabilir.

1. Uygun bir pansuman boyutu/şekli seçin. Mممكün olduğunda, spesifik anatomičk bölge için optimize edilmiş bir pansuman tipi seçin.

Yaralarda kullanım için:

Yara pedi, yara etrafındaki cildi maserasyondan korumak ve pansumanın iyice sabitlenebilmesi için yara etrafındaki kuru cildi 1-2 cm kadar örtmelidir.

Önlem için kullanılırsa:

Yara pedinin, basınç hasarı/doku hasarı riski olan alanı kapladığından emin olun.

Yaralarda kullanım için:

Yarayı, klinik uygulamalara uygun bir şekilde temizleyin. Yara çevresindeki cildi iyice kurulayınız.

3. İlk açma filmini çıkarın ve yapışkan tarafı yaraya uygulayın.

4. Diğer açma filmlerini çıkarın ve pansumanı cilt üzerinde iyice düzeltin. Germeyin.

Mepilex Border Flex, yaranın ve çevresindeki cildin durumuna bağlı olarak veya klinik uygulamalarda belirtildiği gibi 7 güne kadar yerinde bırakılabilir.
Yaralarda kullanım için:

- Mepilex Border Flex, kompresyon sargılarının altında kullanılabilir.

- Mepilex Border Flex, debridmani desteklemek üzere yara ortamının nemli kalmasını sağladığından başlangıçta yara büyütüğünde artış görülebilir. Bu durum, normaldir ve görülmesi beklenir.

- Pansuman rejiminin değiştirilmesi, başlangıçta eksüda düzeyinin artmasına neden olabilir ve geçici olarak değiştirme sıklığının artırılması gerekebilir.

Önlem için kullanılırsa:

Basınç ülseri/doku hasarı riskinin bulunduğu alan düzenli aralıklarla klinik uygulamalar doğrultusunda incelenmelidir.

İmha işlemi, yerel çevresel prosedürlere göre yapılmalıdır.

Diğer bilgiler

Üründe kullanılan poliüretan köpük; ışık, hava ve/veya ışıya maruz kaldığında daha sarı rengé dönübilir. Ürün son kullanma tarihinden önce kullanıldığından, renk değişikliğinin ürün özellikleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Mepilex Border Flex kullanımı ile ilgili ciddi bir olay meydana geldiğinde, Mölnlycke Health Care'ye bildirilmelidir.

Mepilex® ve Safetac® Mölnlycke Health Care AB'nin tescilli ticari markalarıdır.



Produktu aprašymas

Mepilex® Border Flex yra savaimė priliumpantis, sugeriantis ir drėgme palaikantis aplink gylančią žaidžia tvartis. Vandens nepralaidus išorinius siluksnis apsauguoja nuo nėšarumų ir bakterijų. Tvarstis turi Satelac® su žaidžia besilitėanti siluksnį, kuris yra unikalūs lipni medžiaga. Jei naudojant sumaišomas pacientų skausmas ir žaidžia bei aplinkinės odos traumavimais numatant tvartis.

Mepilex Border Flex sudėti:

- su žaidžia besilitėanti siluksnis, kurį sudaro minkšta lipni silikonių medžiaga (Satelac) ir pagrindinė plėvelė;
- lankstus, sugeriantis iklotas iš triju siluksniu: putų, neaustinės medžiagos dengiamoją siluksnio ir plikiui sugeriančią plėvę; žaidžia tvartis iš dailes perforuotas, naudojant Flex technologiją;
- ar už pralaidai, tačiau vandeniniu nepralaidi išorinė plėvelė, apsauganti nuo išorinio užteršimo.

Tvarstio medžiagų sudėties:

Silikonas, poliuretanas, poliakrilatas, medvilnė, viskozė, poliesteris ir poliolefinas.

Naudojimo indikacijos

Mepilex Border Flex skirtas įvairioms žaidžiams, kuriosse vyksta eksudacija, gydyti: praguloms, blažių ir pedi opoms, trauminiems žaidžiams (pvz., odos, jptlēsmams) ir chirurginiems žaidžiams. Kartu su geliu Mepilex Border Flex galima dėti ant sausų žaidžių arba žaidžių su nekrozu. Mepilex Border Flex mažina pooperaciinių pūstlių susidarymą, taip pat galį buti naudojamas kaip profilaktinės terapijos dažlis siekiant apsaugoti oda nuo pažeidimo, pvz., ant pragulų.

Atsargumo priemonės

- Nenaudoti pacientams, jei žinoma, kad jie alergiški gaminiui medžiagoms / komponentams.
- Nenaudoti kartu su oksiduojančiomis medžiagomis, pvz., hipochlorito tirpalais ar vandenilio peroksidu.
- Jei matote infekcijos požymių, pvz., pasireiškė karčžiavimas ar žaidžia arba aplinkinė oda paraudo, jai kaito ar patino, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą dėl tinkamo gydymo.
- Tvarstis kaip profilaktinės priemonės naudojimas nereškia, kad galima atsisakyti jį prastiui, pradugno metodu, t. y. atlinkei amžinam paviršių naudojimo, paciento padėties keitimo, mylibus, odo s drėkinimo ir priežiūros.
- Pakartotinai nenaudoti. Naudojant pakartotinai, gali pablogėti produkto savybės ir jų ykštį kryžminis užkretėti.
- Sterilius. Nenaudokite, jei priežiūra buvo pažeista sterilius barjeras arba buvo atidaryta pakuojet. Pakartotinai nesteriliuoti.

**Naudojimo instrukcija**

Mepilex Border Flex galima naudoti asmeninėms prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. 1. Pasirinkite tinkamą tvarstio dydį / formą. Kai taikytina, rinkite tvarstio formą, optimizuotą konkrečiai anatominėje vietoje.

Naudojimas ant žaidžių

Išvalykite žaidžia pagal klinikinius reikalavimus. Kruopščiai nusausinkite aplinkinę oda.

Žaidžiu tvartis tur uždeginti bent 1-2 cm odos prie žaidžios kraštu, kad apsaugotu aplinkinę oda nuo maceracijos ir tvirtai prilipstu.

Jeigu naudojama profilaktikai

Užtikrinkite, kad žaidžios iklotas uždengtu vietą, kurioje gali atsirasti pragula / audinių pažeidimas.

2. Naudojimas ant žaidžių

Išvalykite žaidžia pagal klinikinius reikalavimus. Kruopščiai nusausinkite aplinkinę oda.

3. Numkite pirmają apsauginę plėvelę ir tvarti lipniaja pusė prie glauskite prie žaidžios.

4. Numkite likusią apsauginę plėvelę ir prispausdami prie odos išsiginkite tvarstio kraštas.

Netempkite.

Mepilex Border Flex galima palaikti priklijuota iki 7 dienų, priklausomai nuo žaidžios ir aplinkinės odos būklės, arba naudoti, kai pirmata klinikinėje praktikoje.

Naudojimas ant žaidžių:

Mepilex Border Flex galina dėti po spaudžiančiuoju tvarstiu.

• Kadangi Mepilex Border Flex palaiko drėgmenę, gyliačioje žaidžioje, kurį padeda pasišalinti apmiruisius žaidžios deliūms, iš priežiūros žaidžios apimtis gali padidėti. Tai yra normalu ir tikėtina.

• Pasikeitus perritimo metodikai, iš pradžių gali susidaryti daugiau eksudato, todėl laikinai gali prireikti dažniau keisti tvarstį.

Jeigu naudojama profilaktikai:

Vielą, kurioje gali atsirasti pragula ar audinių pažeidimas, reikia reguliarai tikrinti pagal klinikinės praktikos instrukcijas.

Utilizuoti pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus.

Kita informacija

Produkte naudojamos poliuretano putos gali pageleti veikiamos šviesos, oro ir (ar) aukštos temperatūros. Toks spakavas pokytis neturi jokių poveikio produkto savybems, jei produktas naudojamas iki jo galiojimo laiko pabaigos.

Klusi reiškinimų su Mepilex Border Flex susijusiam incidentui, apie jį reikia pranešti Mölnlycke Health Care.

Mepilex® ir Satelac® yra registruotieji Mölnlycke Health Care AB prekių ženklai.



Mepilex® Border Flex

Pašlīpošs mīkstā silikona putu pārsējs



Produkta apraksts

Mepilex Border Flex ir pašlīpošs, absorbējošs pārsējs, kas brūces vidi uztur miklu. Ūdensizturīgais ārējais slānis brūci pasargā no netīrumiem un baktērijiem. Pārsējam ir Safetac® brūces kontaktslānis, kas ir unikāla adhēzijas tehnoloģija. Tā mazina sāpes pacientam, kā arī brūču un apkārtējās ādas traumēšanas risku, pārsēju noņemot.

Mepilex Border Flex sastāvdalas:

- brūces kontaktslānis, ko veido mīkstā silikona adhezīvs (Safetac), un plēves pārklājums,
- elastīgs, absorbējošs spilventiņš, ko veido trīs slāni: putas, neausts izkliedējošs slānis un slānis ar superabsorbenta šķiedrām; brūces spilventiņš ir daļēji perforēts, izmantojot Flex cut tehnoloģiju,
- ārēja plēve, kas ir elpojoša, bet ūdensnecaurlaidīga, nodrošina barjeru pret ārējo piesārņojumu.

Pārsēja materiālu sastāvs:

silikons, poliuretāns, poliakrilāts, kokvilna, viskoze, poliesters un poliolefīns.

Lietošanas indikācijas

Mepilex Border Flex paredzēts uzlikt dažādām eksudējošām brūcēm, piemēram, spiediena čūlām, kājām un pēdu čūlām, traumatiskām brūcēm (tādām kā ādas plūsumi) un kirurģiskām brūcēm.

Mepilex Border Flex kopā ar geliem var izmantot arī sausū/nekrotisku brūču ārstēšanai.

Mepilex Border Flex mazina čulgū veidošanos pēcoperācijas brūcēm, to var lietot arī profilaktiski, lai novērstu ādas bojājumu rašanos, piem., spiediena čūlu veidošanos.

Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst izmantot pacientiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret izstrādājuma materiāliem/sastāvdalām.
- Nedrīkst lietot kopā ar tādām oksidējošām vielām kā hipohlorīta šķīdums vai udejraža peroksīds.
- Ja redzamas infekcijas pazīmes, piemēram, iekaisums vai brūce ir apsārtusi, karsta vai uztūkusi, par ārstēšanu jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.
- Pārsēja izmantošana profilaktiskai terapijai neaizstāj nepieciešamību turpmāk izmantot un ievērot vispusīgu protokolu spiediena čūlu novēršanai, t. i., atslogojošas virsmas, pozicionēšana, uzturs, hidratācija, ādas kopšana un mobilitāte.
- Nelietot atkārtoti! Atkārtoti lietojot izstrādājumu, tā efektivitāte var pasliktināties, turklāt iespējama krusteniska inficēšanās.
- Sterils. Nelietot, ja sterīlā barjera ir bojāta jau pirms lietošanas vai ir bijusi atvērta. Nesterilizēt atkārtoti!

Lietošanas norādījumi

Kvalificēta veselības aprūpes speciālista uzraudzībā Mepilex Border Flex drīkst lietot arī neprofesionāļi.

1. Izvēlieties piemērotu izmēra/formas pārsēju. Izraugieties konkrētajai anatomiskajai vietai labāko pārsēja modeli, ja tāds ir.

Izmantošanai uz brūcēm:

brūces spilventinām par vismaz 1–2 cm jāpārklājas pāri brūces malai, lai apkārtējo ādu pasargātu no macerācijas un pārsēju nostiprinātu stingri.

Ja lieto profilaktiski:

brūces spilventinām jāapklāj spiediena traumas/audu bojājuma apdraudētais ādas laukums.

2. Izmantošanai uz brūcēm:

brūci tīriet saskaņā ar kliniskās prakses principiem. Rūpīgi nosusiniet ādu ap brūci.

3. Noņemiet pirmo aizsargplēvi un līpīgo pusī uzlieciet uz brūces.

4. Noņemiet atlikušās aizsargloksnes un nogludiniet pārsēja malu pie ādas. Neiestiepiet to.

Mepilex Border Flex uz brūces var atstāt 7 dienas, nēmot vērā konkrētās brūces un apkārtējās ādas stāvokli vai kliniskās prakses principus.

Izmantošanai uz brūcēm:

- Mepilex Border Flex var izmantot zem spiedošiem pārsējiem.
- Tā kā Mepilex Border Flex saglabā brūčē mitru vidi, veicinot bojāto audu evakuāciju, sākotnēji brūce var palielināties. Tas uzskatāms par normālu procesu.
- Pārsēja lietošanas režīma maiņas dēļ sākotnēji var palielināties eksudāta apjoms, tāpēc kādu laiku pārsējs, iespējams, būs jāmaina biezāk.

Ja lieto profilaktiski:

spiediena čūlu/audu bojājumu apdraudētais ādas laukums regulāri jāpārbauda saskaņā ar kliniskās prakses principiem.

Izstrādājums jālīkvidē saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

Cita informācija

Ja uz pārsēju iedarbojas gaisma, gaiss un/vai karstums, tajā izmantotais poliuretāna putu slānis var klūt dzeltenīgs. Taču krāsas izmaiņas nekādā veidā neiेतekmē izstrādājuma īpašības, ja to izmanto pirms derīguma termina beigām.

Ja Mepilex Border Flex dēļ noticis kāds nopietns negadījums, par to jāziņo ražotājam Mölnlycke Health Care.



Mepilex® Border Flex

Isekleepuv pehme silikoongiga kaetud vahmaterjalist haavaplaaster

Toote kirjeldus

Mepilex Border Flex on isekleepuv ja imav haavaplaaster, mis tagab haava paranemist soosiva nii like keskkonna. Veekindel, välimine kihit kaitseb harva mustuse ja bakterite eest. Haavaplaasteril on Safetac®-i kontaktkihi, mis on ainulaadne kleepuv tehnoloogia. See minimeerib patsientidel haavaplaasti eemaldamisel valu ning haavade ja ümbritseva nahha traumeerimist.

Mepilex Border Flex koosneb:

- haavaga kokkupuutes olevalt pehmest kleepuvast silikoonihiist (Safetac) ja klihest;
- elastiseest imavast kolmekihiisest padjast: vahmaterjalist, mittekootud kattekihiist ja ülimalt imavateku kihiist; haavaplaaster on osaliselt perforeeritud Flex-iööke tehnoloogia abil.
- välimiskihi, mis on hingav kuid veekindel, ja pakub kaitset välist saasteainete eest.

Haavaplaasti koostisosad:

- silikoon, polüuretaan, polüakrilaat, puuvill, viskoos, polüester ja polüoleefin.

Kasutusjuhend

Mepilex Border Flex on loodud mitmesugustele eksudaati eriavatele haavatüüpidele, nagu lamaatiste, jalahaavanditele, traumatiitidele haavatele (nt. naharebendil) ja kirurgilistele haavadele. Mepilex Border Flex võib kasutada kui valg/nekrootiliistel haavadel koos geeliga. Mepilex Border Flex vähendab postoperatiivsete viliidite teket ja seda võib kasutada osana profülaktilisest ravist nahakahjustuste välimiseks (nt. lamaatiste puhul).

Kasutusjuhend

Mepilex Border Flex on loodud mitmesugustele eksudaati eriavatele haavatüüpidele, nagu lamaatiste, jalahaavanditele, traumatiitidele haavatele (nt. naharebendil) ja kirurgilistele haavadele. Mepilex Border Flex võib kasutada kui valg/nekrootiliistel haavadel koos geeliga. Mepilex Border Flex vähendab postoperatiivsete viliidite teket ja seda võib kasutada osana profülaktilisest ravist nahakahjustuste välimiseks (nt. lamaatiste puhul).

Ettevaatustabinõud

- Ärge kasutage seda patsientidel, kel leel on teadaolev tundlikkus tootes kasutatavate materjalide/ komponentide suhtes.
- Ärge kasutage seda koos oksudeeriatate ainetega nagu hüpoploidiadused või vesinikperoksid.
- Kui määrake polektörni, nt. palairik, harv või ümbrissev nahk on punane, kum või paistev, pidage sobiva rav'i üle noul tervishoiutöötajaga.
- Haavasidemeid kasutamine protülaktilise rav'i osana ei kohata vajadust arendada ja järgida põhjalikku laamistite välimise protokoli, sealhulgas tugipindasi, kehaasendit, toitumist, vedelike tarbijmist, nahahooldust ja liikuvust.
- Ärge taaskasutage. Taaskasutamisel võib tööd usaldusväärus halveneda ja võib tekkida riisustamine.
- Steriilne. Ärge kasutage, kui sterilne ümbriks on enne kasutamist kahjustatud või avatud. Ärge steriliseerige uuesti.



Kasutusjuhend

Mepilex Border Flex on mõeldud kasutamiseks tavakasutajale kvalifitseeritud tervishoiutöötaja järelvalve all.

1. Valige sobiv haavaplastrti suurus/kuju. Vejaduse korral valige haavaplaaster, mille kuju sobib anatoomiliselt piirkonnale kõige paremini.

Kasutamisel haava peal:

Haavapadi peab olema kuvast ümbrisevast nahapüürkonnast vähemalt 1–2 cm suurem, et kaitsta ümbrisevat nahka matseratsiooni eest ja kinnitada plaaster kindalt.

Kasutamisel protüktatikaks

Veenduge, et haavapadi kataks vigastuse/koskahjustuse ohus oleval piirkonda.

2. Kasutamisel haava peal:

Puhastage haav, järgides kliinilisi tavasid. Kuvatage ümbrisev nahk hoolikalt.

3. Eemaldage esimene katske ja asetage kleepuv pool haavale.

4. Eemaldage ülejäävud kaitsekiled ja siiluge pleastrit nahale piiril. Ärge venitate haavaplastrit. Haava ja ümbriseva nahha olukorrasst või kliinilisest tavast ole neaval võib Mepilex Border Flexi jäätta.

Kasutamisel haava peal:

• Mepilex Border Flexi võib kasutada röhksidemete all.

• Kuna Mepilex Border Flex tagab haava ümber surnum koe eemaldumist soosiva niiske keskkonna, võib haava suurus aigult kasvada. See on normaalne ja otutospärane.

• Sidumisviisi muutmisega võib algul kraasneda suurem eksudaadi eritumine, mistöötu haav võib ajutiselt vajada sagedasemat sidumist.

Kasutamisel profülaktikaks

Lamaatise/kookahjustuse ohus piirkonda tulub kliinilise tava kohaselt regulaarselt kontrollida.

Jäätmeid tuleb käiteda kohalike keskkonnanäitajade kohaselt.

Tootes kasutatakse polüüreetaanvahmaterjal, võib valguse, ööju ja/või soojuse toimel muutuda kollaseks. Värvuse muutust ei mõjuta tööd omadusi, kui seda kasutatakse enne kööblikkusaja möödumist. Kui Mepilex Border Flexiga seoses toimub tosine intsident, tuleks sellest teatada ettevõtele Mölnlycke Health Care.

Muu teave

Mepilex® ja Safetac® on ettevõtte Mölnlycke Health Care AB registreeritud kaubamärgid.



Mepilex® Border Flex

Самоклеящаяся губчатая повязка с покрытием из мягкого силикона



Описание изделия

Самоклеящаяся повязка Mepilex Border Flex поглощает экссудат и поддерживает влажную среду в ране. Водонепроницаемый внешний слой защищает рану от грязи и бактерий. Повязка имеет контактирующий с раневой поверхностью слой Safetac®, который создается с использованием уникальной технологии самоклеящихся повязок. Использование этого слоя минимизирует болевые ощущения у пациента и травмирование раны и кожи вокруг нее при снятии повязки.

Повязка Mepilex Border Flex состоит из следующих компонентов:

- слоя, контактирующего с раневой поверхностью и состоящего из мягкого силикона (Safetac) и внешней защитной пленки;
- гибкой абсорбирующей прокладки, состоящей из трех слоев — губки, слоя нетканого материала и слоя волокон с повышенной поглощающей способностью, раневая прокладка частично перфорирована по технологии Flex cut;
- внешней воздухопроницаемой, но водонепроницаемой пленки, обеспечивающей барьер для внешних загрязнений.

Состав материала повязки:

силикон, полиуретан, поликарилат, хлопок, вискоза, полиэстер, полиолефин.

Показания к применению

Повязка Mepilex Border Flex предназначена для лечения широкого спектра экссудирующих ран, например пролежней, язв на голенях и стопах, травматических ран (например, разрывов кожи) и хирургических ран. Mepilex Border Flex также можно применять для сухих/некротических ран в сочетании с гелями.

Mepilex Border Flex уменьшает послеоперационные нарывы и может использоваться как компонент профилактического лечения для предотвращения повреждений кожи, например пролежней.

Меры предосторожности

- Нельзя использовать на пациентах с доказанной повышенной чувствительностью к материалам/компонентам, из которых изготовлено изделие.
- Не применяйте в сочетании с окислителями, например, растворами гипохлорита или перекиси водорода.
- При наличии признаков инфекции, например при повышенной температуре, покраснении раны, локальном ощущении тепла или отеке обратитесь к медицинскому работнику для получения соответствующего лечения.
- Использование повязок в составе профилактического лечения не отменяет необходимость продолжать применение и соблюдение в полном объеме протокола ведения больных с целью профилактики пролежней, например использование противопролежневых матрацев, прокладок и систем, надлежащее размещение и изменение положения тела, адекватный диетический и питьевой режим, уход за кожей, стимулирование самостоятельного перемещения.
- Не используйте изделие повторно. При повторном применении эффективность изделия может снизиться, а также возможно возникновение перекрестного заражения.
- Стерильно. Не используйте изделие, если его стерильный барьер был поврежден или вскрыт до использования изделия. Не подвергайте повторной стерилизации.

Инструкция по применению

Повязка Mepilex Border Flex может использоваться непрофессионалами под наблюдением квалифицированного медицинского работника.

1. Выберите повязку подходящего размера/формы. Где применимо, выберите повязку с формой, оптимизированной для конкретной анатомической локализации.

При использовании на ранах:

Раневая прокладка повязки должна перекрывать окружающую кожу не менее чем на 1–2 см. Это необходимо для защиты окружающей кожи от макерации, а также для надежной фиксации повязки.

При использовании для профилактики:

Убедитесь, что раневая прокладка закрывает участок, подверженный образованию пролежней/повреждению тканей.

2. При использовании на ранах:

Выполните очистку раны в соответствии с клинической практикой. Тщательно осушите окружающую кожу.

3. Удалите первую снимаемую пленку и приложите повязку липкой стороной к ране.

4. Снимите остальные защитные пленки и пригладьте края повязки на коже. Не растягивайте повязку.

Повязку Mepilex Border Flex можно оставлять на месте до 7 дней в зависимости от состояния раны и окружающей кожи либо менять в соответствии с клинической практикой.

При использовании на ранах:

- Mepilex Border Flex можно применять под компрессионной повязкой.
- Поскольку повязка Mepilex Border Flex поддерживает влажную среду в ране и способствует отторжению некротизированных тканей, возможно первоначальное увеличение размеров раны. Это нормальное и ожидаемое явление.
- Изменение режима перевязок может привести к первоначальному увеличению экссудации, в результате чего может временно потребоваться более частая смена повязки.

При использовании для профилактики:

Участок, подверженный образованию пролежней/повреждению тканей, необходимо регулярно осматривать в соответствии с принятой клинической практикой.

Утилизацию следует проводить в соответствии с местными правилами экологической безопасности.

Прочая информация

Полиуретановая губка, используемая в изделии, при воздействии света, воздуха и/или тепла может пожелтеть. Изменение цвета не влияет на свойства изделия, если срок его годности не истек.

При любом серьезном инциденте, связанным с Mepilex Border Flex, обязательно уведомите Mölnlycke Health Care.

Mepilex® и Safetac® являются зарегистрированными товарными знаками компании Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border Flex

Samolepljivi povoj od meke silikonske pjene

Opis proizvoda

Mepilex Border Flex samoljepljivi je i upijajući povoj koji zadržava vlažnost rane. Vodootporni vanjski sloj štiti ranu od prijavične i bakterije. Povoj ima kontaktni sloj za ranu Safetac® koji predstavlja jedinstvenu tehnologiju prijanjaja. Smanjuje bolest bolesnika te tramu rana i okoline kože prilikom uklanjanja povojia.

Mepilex Border Flex sastoji se od:

- kontaktnog sloja za ranu koji se sastoji od mekanog silikonskog jlepila (Safetac) i folije
- prilagodljivog, apsorbirajućeg obloga u tri sloja: sloja pjene, netkanog nastezljivog sloja i stoga superapsorbirajućih vlakana; povoj za rane djelomično je perforiran pomoću tehnologije izravnjiva Flex
- vanjske folije koja propušta zrak, ali je vodootporna, čime se onemogućuje ulazak kontaminirajućih čestica izvana.

Sastav povojia:

silikon, poliuretan, poliakrilat, pamuk, viskoza, poliester i poliolefin.

Upute za upotrebu

Mepilex Border Flex namijenjen je za primjenu kod čitavog niza eksudirajućih rana, poput dekubitalnog ulkus, ulikusa kruni i traumatskih rana (npr. razdrotina kože) i kirurških rana. Mepilex Border Flex može se upotrebljavati i na suhim/nekrotičnim ranama u kombinaciji s gelovima. Mepilex Border Flex smanjuje postoperativne pliske i može se upotrebljavati kao sastavni dio profilaktičke terapije u prevenciji ostecenja kože, npr. dekubitusa.

Mjere opreza

- Ne upotrebljavajte kod pacijenata s poznatom preosjetljivošću na sastavne materijale/komponente proizvoda.
- Nemojte ga upotrebljavati zajedno s oksidirajućim sredstvima kao što su hipokloritne otopine ili vodikov peroksid.
- Ako primijete znake infekcije, npr. povušenu tjelesnu temperaturu ili ako su rana ili okolina koža crvene, tople ili natečene, obratite se zdravstvenom djelatniku radi odgovarajućeg liječenja.
- Upotreba ovog povojia kao sastavnog dijela profilaktičke terapije ne isključuje potrebu za nastavkom primjene općeprihvaćenog protokola za prevenciju dekubita, naročito u slučaju podloga, pozicioniranja pacijenta, prehrana, hidracija, njega kože i kretanje.
- Nemojte ponovo upotrebljavati. Kod višekratne upotrebe svojstva proizvoda mogu oslabiti te može doći do unakrsne kontaminacije.
- Sterilno. Ne upotrebljavajte ako je sterilna zaštita oštećena ili otvorena prije upotrebe. Nemojte ponovno sterilizirati.

Upute za upotrebu

Mepilex Border Flex treba upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenih djelatnika.

1. Odaberite odgovarajući veličinu/oblik povojia. Kad je to primjenjivo, odaberite oblik povojia namijenjen određenom anatomskom području.

Za upotrebu na ranama:

Povoj za rane trebao bi prelaziti rubove rane na okolnu suhu kožu za najmanje 1 do 2 cm kako bi se okina koža zaštitila od maceracije, a povoj dobro učvrstio.

Za preventivnu upotrebu:

Provjerite pokriva li povoj za rane područje na kojem postoji opasnost od pojavе dekubita/ostečenja tkiva.

2. Za upotrebu na ranama:

Očistite ranu u skladu s kliničkom praksom. Temeljito osušite okolinu kožu.

3. Uklonite prvu zaštitnu foliju i položite jlepiju stranu na ranu.

4. Uklonite preostalu zaštitnu podlogu i zagladite rubove na koži. Nemojte rastezati.

Mepilex Border Flex može se upotrebljavati najviše 7 dana, ovisno o stanju rane i okoline kože ili kakve je indicirano kliničkom praksom.

Za upotrebu na ranama:

• Mepilex Border Flex može se upotrebljavati i pod kompresivnog zavoja.

• Budući da Mepilex Border Flex zadržava vlažnost rane i time posporjeđuje nezin debridman, u početku liječenja rana se može povećati. To je normalna i očekivana pojava.

• Promjena režima previjanja može rezultirati početnim povećanjem izlučivanja, što privremeno može zahtijevati češće previjanje.

Za preventivnu upotrebu:

Područje na kojem postoji opasnost od pojave dekubita/ostečenja tkiva treba provjeravati u pravilnim vremenskim razmacima u skladu s kliničkom praksom.

Odložite u skladu s lokalnim postupcima za zaštitu okoliša.

Ostale informacije

Poliuretanska pjena koja je upotrijebljena u proizvodu može promijeniti boju i postati žuća ako se izloži svjetlosti, zraku i/ili vrućini. Promjena boje nema nikakvog utjecaja na svojstva proizvoda ako se prizvodi upotrijebi prije isteka roka valjanosti. Svaki ozbiljan incident povezan s upotrebom povojia Mepilex Border Flex treba prijaviti tvrtki Mölnlycke Health Care.

Mepilex® i Saletac® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Mölnlycke Health Care AB.



Mepilex® Border Flex

Samolepljiva obloga od mekog silikona i poliuretanske pene

Opis proizvoda

Mepilex Border Flex je samolepljiva i upijajuća obloga koja zadržava vlažnu sredinu rane. Vodootporni spoljni sloj štiti ranu od prijavnih i bakterija. Obloga poseđuje Safetac® sloj koji dolazi u kontakt sa ranom i ima jedinstvenu tehnologiju izrade prijajajućeg materijala. Ona ublažava bol kod pacijenta i smanjuje traume rane i okoline kože prilikom uklanjanja obloge.

Mepilex Border Flex se sastoji od:

- sloja koji dolazi u kontakt sa ranom napravljenog od mekog silikonskog prijajajućeg materijala (Safetac) i nosača u vidu filma
 - savitljivog apsorbujućeg jastučića u tri sloja: pene, netkanog sloja i sloja od superupijajućih vlakana; jastučić za ranu je delimično perforiran Flex tehnologijom sečenja
 - spoljnog filma koji propušta vazduh, ali je nepropusan za vodu i predstavlja prepreku za spoljni kontaminaciju
- Sadržaj materijala obloge:
- silikon, poliuretan, poliakrilat, pamuk, viskoza, poliester i poliolefin.

Indikacije za upotrebu

Mepilex Border Flex je namenjen širokom opsegu eksudirajućih rana, kao što su dekubitalni uluki, uluzi nogu i stopala, traumatske rane (npr. rasjeci kože) i hirurške rane. Mepilex Border Flex može da se koristi i na suvim, odnosno nekrotičnim ranama u kombinaciji sa gelovima.

Mepilex Border Flex smanjuje postoperativne pliske i može da se koristi u sklopu profilaktičke terapije kako bi se sprečilo oštećenje kože , npr. dekubitalni uluzi.

Meri opreza

- Ne koristite na pacijentima za koje se zna da su preosetljivi na unutrašnje materijale/komponente proizvoda.
- Ne koristite zajedno sa oksidansima kao što su rastvori hipohlorita ili vodonik-peroksid.
- Ako primete znake infekcije npr. rana ili okolina koža postaje crvena, topla ili otečena, obratite se stručnom zdravstvenom osoblju radi odgovarajućeg lečenja.
- Upotreba obloge u sklopu profilaktičke terapije ne isključuje potrebu za daljim razvojem i prerađenjem sveobuhvatnog protokola za prevenciju dekubitalusa, tj. upotreboom podupirača, promenom položaja, ishranom, hidracijom, negom kože i kretanjem.
- Ne koristite ponovo. Pri ponovnoj upotrebi, efikasnost proizvoda može da se smanji i može doći do unakrsne kontaminacije.
- Sterilno. Nemojte da koristite ako je sterilna barijera oštećena ili otvorena pre upotrebe.Ne podgrjavajte ponovnoj sterilizaciji.

Uputstvo za upotrebu

Mepilex Border Flex mogu da koriste nestručna lica pod nadzorom stručnog zdravstvenog osoblja.

1. Izberite odgovarajuću veličinu/oblik oblage. Kada je primenjivo, odaberite oblik oblage optimizovan za određeno anatomsko mesto.

Za upotrebu na ranama:

- Obloga za rane bi trebalo da prekriva suvu okolnu kožu najmanje 1-2 cm da bi se okolna koža zaštiti od maceracije i obloge sigurno fiksirala.
- Ako se koristi preventivno:
- Uverite se da jastučić za ranu pokriva oblast izloženu rani nastaloj usled pritisaka/oštećenju kože.

2. Za upotrebu na ranama:

- Očistite ranu u skladu sa uobičajenom kliničkom praksom. Temeljno osušite okolnu kožu.
3. Skinite prvi zastitni film i stavite lepljivu stranu na ranu.
4. Skinite preostale zaštitne trake i izravnajte ivicu na koži. Ne rastežite oblogu.

Mepilex Border Flex se može ostaviti na telu do 7 dana, u zavisnosti od stanja rane i okolne kože ili na osnovu indikacija kliničke prakse.

Za upotrebu na ranama:

- Mepilex Border Flex može da se koristi ispod kompresivnog zavojia.
 - Kako Mepilex Border Flex održava vlažnu sredinu rane, što podstiče debridman, u početku može da dođe do povećanja oblima rane. To je normalno i očekivano.
 - Promena režima previjanja može u početku da dovede do pojavičane eksudacije, pa će možda privremeno biti potrebno da se obloga češće menjai.
- Ako se koristi preventivno:
- Oblast izložena riziku od dekubitalnog ulkus/a/oštećenja kože treba redovno da se proverava u skladu sa kliničkom praksom.
- Odlaganje mora da se obavljaju u skladu sa lokalnim procedurama za zaštitu okoline.

Ostale informacije

Poliuretanska pena koja se koristi u izradi proizvoda može da promeni boju u intenzivniju žutu kada se izloži svjetlosti, vazduhu i/ili toploti. Ukoliko se proizvod koristi u okviru roka trajanja, promena boje nema uticaja na njegove karakteristike.

U slučaju ozbiljnog incidenta u vezi sa korišćenjem obloge Mepilex Border Flex, slučaj treba prijaviti kompaniji Mölnlycke Health Care.

Mepilex® i Safetac® su zaštićene robne marke kompanije Mölnlycke Health Care AB.

يمكن أن يستخدم الأشخاص العذلين ضمادة Mepilex Border Flex تحت إشراف مختصي الرعاية الصحية.

١- اختر حجم/شكل الضمادة الملائم، اختر شكل الضمادة الأنماط الموقعة للتشريح المحدد، عند الاقتضاء.

للاستخدام على الجروح:
يجب أن تغطي لبادة الجرح الجلد المحيط الجاف بمقدار لا يقل عن ٢-١ سم لحماية الجلد المحيط من التهاب

والتثبيت الضمادة بشكل آمن.
للاستخدام بغير الوقاية:
نذكر من تغطية لبادة الجرح للجزء المعرض لخطر الإصابة بجروح الضغط/تلف الأنسجة.

٢- الاستخدام على الجروح:
قم بتطهير الجرح وفأّل للممارسات السريرية. ثم جفّف الجلد المحيط جيداً.

٣- قم بزالة طبقة الإطلاق الأولى وضع الجانب اللائق على الجرح.

٤- قم بزالة طبقات الإطلاق المتبقية ثم قم بتنمية الحواف على الجلد برفق.

لآخر بعث الضمادة.

يمكن ترك ضمادة Mepilex Border Flex في مكانها لمدة تصل إلى ٧ أيام تبعاً لحالة الجرح والجلد المحيط به، أو على النحو الموضح من قبل الممارسة السريرية.

للاستخدام على الجروح:
يمكن استخدام Mepilex Border Flex تحت ضمادة مضاغطة.

تحافظ ضمادة Mepilex Border Flex على بينة رطبة للجرح، وهو ما يدعم عملية الإنضار (ازالة الأنسجة الميتة)، حيث يمكن أن تكون هناك زيادة أولية في حجم الجرح. وهذا أمر طبيعي ومتوقع. يمكن أن يؤدي التغيير في نظم الضمادة إلى زيادة أولية في مستوى الأفرازات، وهو الأمر الذي قد يتطلب زيادة معدل التغيير بشكل مؤقت.

للاستخدام بغير الوقاية:
 يجب فحص المنطقة المعرضة لخطر الإصابة بفرج الضغط/تلف الأنسجة على فترات منتظمة وفقاً للممارسات السريرية.
 يجب أن يتم عملية التخلص من الضمادة وفقاً للإجراءات البيئية المحلية.

معلومات أخرى

قد يتغير لون رغوة البولي يوريثان المستخدمة في المنتج إلى لون أكثر اصفراراً عند تعرضاً لها للضوء، وأوّل الهواء، وأو الحرارة. ولا يؤثر تغير اللون على خصائص المنتج إذا ما تم استخدامه قبل التهاء تاريخ صلاحته.

في حال وقع أي حادث خطير فيما يتعلق بـ استخدام ضمادة Mepilex Border Flex، يرجى إبلاغ شركة Mölnlycke Health Care.



Mepilex® Border Flex

ضمادة رغوة لينة من السيلكون ذاتية الالتصاق

وصف المنتج

إن ضمادة Mepilex Border Flex عبارة عن ضمادة ماصّة ذاتية الالتصاق تحافظ على بينة رطبة للجرح، حيث تحمي الطبقة الخارجية المقاومة للفحاذ الماء الجرح من التعرّض للتلوث والبكتيريا. وتتميز الضمادة بوجود طبقة Safetac® الملائمة للجرح وهي تقيّة لاصقة فريدة من نوعها. حيث تقلّل الآلام الذي يشعر به المرضى والصدمات التي تتعرّض لها الجروح والجلد المحيط بها عند إزالة الضمادة.

تكون ضمادة Mepilex Border Flex مما يأتي:

طبقة ملائمة للجرح تكون من طبقة لاصقة لينة مصنوعة من السيلكون (Safetac) وتحمل طبقة.

لبادة مرنة ماصّة تتكون من ثلاث طبقات: رغوة، وطبقة غير منسوجة قابلة للتمدد، وطبقة بها ألياف فاتحة الامتصاص، وتتميز لبادة الجرح بأنها مقاومة جزيئياً باستخدام تقنية القفل المرن.

طبقة خارجية تسمح ب penetration الهواء لكنها مقاومة للفحاذ الماء، مما يوفر حاجزاً أمام الملوثات الخارجية.

محظوظ مواد الضمادة:

السيلكون، والبولي يوريثان، والبولي أكريلات، والنقطن، والفسكرز، والبوليسترن، والبولي أوفين.

دواعي الاستخدام:

إن ضمادة Mepilex Border Flex مصممة للفحاذ كبيرة من الجروح الناضجة، مثل فرج الضغط وفرج الساق والقدم، والجروح الضرجية (مثل: الجلد المتمزق) والجروح الجراحية. ويمكن أيضًا استخدام ضمادة Mepilex Border Flex مع الجروح الجبلية/الخزفية مع المواد الهمائية.

تقلّل ضمادة Mepilex Border Flex من تقرّحات ما بعد العمليات الجراحية، ويمكن أن تُستخدم أيضًا كجزء من العلاج الوقائي المساعدة على منع تآدي الجلد، مثل فرج الضغط.

الاحتياطات:

لا تستخدم الضمادة مع المرضى المعروف إصابتهم بالحساسية المفرطة من المواد/المكونات الفعالة لهذا المنتج.

لا تستخدم الضمادة مع عوامل مؤكسدة مثل، محلول البيوكلريريت أو بيروكسيد الهيدروجين. في حال ظهور أعراض للالتهاب، مثل الحمى أو تحول الجرح أو الجلد المحيط به إلى اللون الأحمر، أو أصحاح دافئين أو تورّم، استشر مختص الرعاية الصحية لتلقي العلاج المناسب.

إن استخدام الضمادات كجزء من العلاج الوقائي لا يعني عدم الحاجة إلى مواصلة وضع بروتكول شامل لمنع الإصابة بفرج الضغط/التياع، مثل أسطح الدعم، وتحديد المرض، والتغذية والتغذيف، والعناية بالبشرة والحركة.

لا تستخدم الضمادة أكثر من مرة واحدة. إذا تم استخدام الضمادة لأكثر من مرة، فقد يتدهور أداؤها وقد ينتج عن ذلك انتقال التلوث.

الضمادة معقمة، لذا تجنب استخدامها إذا كان الحاجز المعدّم تالف أو فتح قبل الاستخدام. ولا تقم بإعادة تعقيم الضمادة.

AUSTRALIA Mölnlycke Health Care Pty. Ltd.
12 Narabang Way, Belrose, NSW 2085
Tel: +61 02 8977 2144

AUSTRIA Mölnlycke Health Care GmbH
Europlaza, Wagenseilgasse 14, 1120 Vienna
Tel: +43 1 278 85 42
Customer Service Tel: 0800 292 874

BELGIUM Mölnlycke Health Care NV/SA,
Berchemstadionstraat 72, B2,
B-2600 BERCHEM [Antwerpen]
Tel: +32 3 2868 950

CANADA Mölnlycke Health Care Inc.,
2010 Winston Park Drive, Suite 100,
Oakville, Ontario, L6H 5R7
Tel: +1 905 829 1502

CHINA Mölnlycke Health Care
[Shanghai] Co., Ltd.
RM 629, No.8 Hua Jing Road,
Wai Gao Qiao FTZ Shanghai, China
Tel: +86 10 5128 8571

CZECH REPUBLIC Mölnlycke Health Care s.r.o.
Hajkova 2747/22, 130 00 Prague 3
Tel: +420 221 890 517 [Reception]
Tel: +420 221 890 511 [Customer Service]

DENMARK Mölnlycke Health Care ApS,
Gydevang 33, DK-3450 Allerød
Tel: +45 48 16 82 68
Customer Service Tel: +80 886 810

ESTONIA Mölnlycke Health Care OÜ,
Vabaõhumuuseumitee 4-67, EE-13522 Tallin
Tel: +372 671 1520

FINLAND Mölnlycke Health Care Oy,
Pitäjämäentie 14, 3 krs, FI-00380 Helsinki
Tel: +358 201 622 300
Customer Service Tel: 0800 113 442

FRANCE Mölnlycke Health Care SAS,
13 Allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
Tel: +33 320 122 555
Customer Service Tel: 0800 910 292

GERMANY Mölnlycke Health Care GmbH
Grafenberger Allee 297
DE-40237 Düsseldorf
Tel: +49 211 92 08 80
Customer Service Tel: 0800 186 21 80

HUNGARY Mölnlycke Health Care Kft
HU-1134 Budapest, Dévai u. 26-28. III. em.
Tel: +36 1 477 3080

INDIA Mölnlycke Health Care India Pvt Ltd
Universal Business Centre
Second Floor, Universal Trade Tower
Sector 49, Gurgaon Sohna Road
Gurgaon 122 018, Haryana
Tel: +91 124 4696 008

ITALY Mölnlycke Health Care s.r.l.,
Via Marsala 40/C, IT-21013 Gallarate (VA)
Tel: +39 0331 714 011

JAPAN Mölnlycke Health Care KK,
4F Conceria Nishi-Shinjuku Tower's West
6-20-7 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-Ku, Tokyo 160-0023
Tel: +81 3 6914 5004

KOREA Mölnlycke Health Care Korea Co., Ltd
2nd floor, Hansol Richville.
46 Wiryeseong-daero,
Songpa-gu, Seoul, 05627
South Korea
Tel: +82 2 3789 1402

LATVIA Mölnlycke Health Care AB,
Dzelzavas 120 M, Riga LV-1021
Tel: +372 6711 522

LITHUANIA Mölnlycke Health Care AB,
J. Galvydžio g. 3, LT 08236 Vilnius
Tel: +370 5 2274 58 37

NETHERLANDS Mölnlycke Health Care B.V.
Postbus 3196, 4800 DD Breda
Tel: +31 76 521 9663

NORWAY Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad, NO-0603 Oslo
Tel: +47 22 70 63 70
Customer Service Tel: 800 161 78

POLAND
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o. o.
ul. Zwycięstwa 17a
15-703 Białystok
Tel: +85 652 77 77

PORTUGAL Mölnlycke Health Care
Rua Brito Capelo, 807
4450-068 Matosinhos
Tel: +351 808 919 960
Customer Service Tel: 800 832 096

RUSSIA Mölnlycke Health Care,
10/3 Toulskaya str., Moscow 115191
Tel: +7 495 232 26 64

SINGAPORE
Mölnlycke Health Care Asia-Pacific Pte Ltd
298 Tiong Bahru Road
#07-03 Central Plaza
Singapore 168730
Telephone: +65 6438 4008

SPAIN Mölnlycke Health Care S.L.,
Av. De La Vega 15, Edif. 3, 3a Planta
ES-28108 Alcobendas [Madrid]
Tel: +34 91 484 13 20
Customer Service Tel: 900 963 232

SWEDEN Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 130 80
SE-402 52 GÖTEBORG
Tel: +46 31 722 30 00
Customer Service Tel: 020 798 264

SWITZERLAND
Mölnlycke Health Care AG
Brandstrasse 24
CH-8952 Schlieren
Tel: +41 44 744 54 00
Customer Service
Tel German: 0800 563 195
Tel French: 0800 563 196

UNITED ARAB EMIRATES
Mölnlycke Health Care
Unit No. 603
Jumeirah Business Center 1, Plot No. G2
Jumeirah Lakes Towers, Dubai
Tel: +971 45 54 73 17

UNITED KINGDOM
Mölnlycke Health Care Ltd.
401 Grafton Gate
Milton Keynes
MK9 1AT
Tel: +44 870 60 60 766
Customer Service, Private
Tel: 0800 917 4919
Customer Service, Public sector
Tel: 0800 917 4918

USA Mölnlycke Health Care US, LLC
5550 Peachtree Parkway
Suite 500, Norcross, GA 30092
Tel: +1-800-882-4582

USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134



Revised 2019-05

40493-39

Master 521425 rev. 04

PD-557963 rev. 00